

**POLA PENGGUNAAN OBAT ASMA  
PADA PASIEN USIA DEWASA RAWAT INAP  
DENGAN DIAGNOSIS AKHIR UTAMA ASMA  
DI RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA  
SELAMA BULAN JANUARI 2006-OKTOBER 2007**

**ABSTRAK**

Telah dilakukan penelitian mengenai Pola Penggunaan Obat Asma Pada Pasien Dewasa Rawat Inap Dengan Diagnosis Akhir Utama Asma Di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Selama Bulan Januari 2006-Oktober 2007. Penelitian ini bersifat non eksperimental dengan rancangan analisa deskriptif yang bersifat retrospektif. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 38 data rekam medis. Berdasarkan analisa data-data yang didapat, diperoleh hasil bahwa Golongan obat asma yang sering digunakan adalah golongan methylxantine sebesar 100% dan corticosteroid sebesar 92,10%. Jenis obat asma yang sering digunakan adalah aminophylline sebesar 100% dan dexametasone sebesar 92,10%. Jenis terapi obat asma yang sering digunakan adalah terapi kombinasi sebesar 92,11%. Rata-rata lama pemberian obat bervariasi. Rute pemberian obat melalui infus (IV) sebesar 100%. Pasien asma usia dewasa yang menjalani rawat inap terbanyak adalah jenis kelamin perempuan sebesar 60,52%. Kelompok usia terbanyak menderita asma adalah usia 34-42 tahun sebesar 28,94%. Rata-rata lama perawatan pasien asma dewasa terbanyak adalah 7-9 hari. Pasien asma usia dewasa dengan penyakit penyerta sebesar 31,58% dan tanpa penyakit penyerta sebesar 68,42%.

**Kata kunci:** Pola penggunaan, Asma, Dewasa

**Nama** : Defi Kurniawati  
**Pembimbing** : (I). Nani Parfati