

**POLA PENGGUNAAN OBAT ASMA PADA PASIEN
ANAK RAWAT INAP DENGAN DIAGNOSIS AKHIR UTAMA ASMA
BRONKIAL DI RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA
SELAMA BULAN JANUARI 2006-OKTOBER 2007**

ABSTRAK

Telah dilakukan pola penggunaan obat asma pada pasien anak rawat inap dengan diagnosis akhir utama asma bronkial di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya selama bulan Januari 2006-Oktober 2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola penggunaan obat asma pada pasien anak dengan diagnosis akhir utama asma bronkial, dengan rancangan analisa deskriptif yang bersifat retrospektif. Penelitian dilakukan terhadap 29 data rekam medik. Berdasarkan analisa data yang didapat, diperoleh hasil bahwa golongan obat asma yang sering digunakan pada pasien anak asma bronkial adalah golongan adrenoseptor agonis sebesar 86,2% dan jenis obat asma yang sering digunakan pada pasien anak asma bronkial adalah salbutamol sebesar 79,3%. Jenis terapi yang sering diberikan pada pasien anak asma bronkial adalah jenis terapi kombinasi sebesar 79,3%, dan jenis obat kombinasi yang sering digunakan adalah salbutamol-ipratropium sebesar 51,75%. Rata-rata lama pemberian obat asma pada pasien anak asma bronkial bervariasi, tetapi pada umumnya sama dengan lama perawatannya. Rute pemberian obat asma yang sering diberikan, melalui rute inhalasi sebesar 79,3%.

Kata kunci: Pola penggunaan, asma bronkial anak, salbutamol

Nama : Nur Amanah

Nrp : 1030189

Pembimbing : (I) Nani Parfati

(II) Dyah Retno Wulan

**POLA PENGGUNAAN OBAT ASMA PADA PASIEN
ANAK RAWAT INAP DENGAN DIAGNOSIS AKHIR UTAMA ASMA
BRONKIAL DI RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA
SELAMA BULAN JANUARI 2006-OKTOBER 2007**

Nur Amanah, 2008

Pembimbing : (I) Nani Parfati, (II) Dyah Retno Wulan

ABSTRAK

Telah dilakukan pola penggunaan obat asma pada pasien anak rawat inap dengan diagnosis akhir utama asma bronkial di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya selama bulan Januari 2006-Oktober 2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola penggunaan obat asma pada pasien anak dengan diagnosis akhir utama asma bronkial, dengan rancangan analisa deskriptif yang bersifat retrospektif. Penelitian dilakukan terhadap 29 data rekam medik. Berdasarkan analisa data yang didapat, diperoleh hasil bahwa golongan obat asma yang sering digunakan pada pasien anak asma bronkial adalah golongan adrenoseptor agonis sebesar 86,2% dan jenis obat asma yang sering digunakan pada pasien anak asma bronkial adalah salbutamol sebesar 79,3%. Jenis terapi yang sering diberikan pada pasien anak asma bronkial adalah jenis terapi kombinasi sebesar 79,3%, dan jenis obat kombinasi yang sering digunakan adalah salbutamol-ipratropium sebesar 51,75%. Rata-rata lama pemberian obat asma pada pasien anak asma bronkial bervariasi, tetapi pada umumnya sama dengan lama perawatannya. Rute pemberian obat asma yang sering diberikan, melalui rute inhalasi sebesar 79,3%.

Kata kunci: Pola penggunaan, asma bronkial anak, salbutamol