

**POLA PENGGUNAAN OBAT PADA PASIEN ANGINA PEKTORIS
YANG MENJALANI RAWAT INAP JANTUNG DI RUMKITAL Dr.
RAMELAN SURABAYA TAHUN 2007-2008**

Marcella Nora Widjanoko, 2009

Pembimbing : (I) S. Joko Semedi (II) Fauna Herawati

ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian non-eksperimental mengenai analisis pengobatan dan kesesuaian terapi terhadap Standar Diagnosis & Terapi Rumah Sakit Dr. Soetomo 2006 pada penderita angina pektoris yang menjalani rawat inap di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya tahun 2007-2008. Metode penelitian yang digunakan adalah metode retrospektif dan dianalisa secara deskriptif. Sebagai bahan penelitian utama adalah data rekam medis pasien dengan diagnosa keluar angina pektoris stabil, tidak stabil dan variant, yaitu sebanyak 52 data rekam medis. Hasil analisis pengobatan : golongan obat yang banyak digunakan untuk terapi angina pektoris adalah nitrat (96,15%), antiplatelet (90,38%), beta bloker (63,46%). Jenis obat yang banyak digunakan untuk terapi angina pektoris adalah Isosorbid Dinitrat (96,15%), Aspirin (88,46%), Clopidogrel (67,31%), Bisoprolol (59,62%). Hasil analisis kesesuaian terapi pada angina pektoris stabil : lima (71,43%) dari tujuh jenis obat yang digunakan memiliki kesesuaian dosis terhadap Standar Diagnosis dan Terapi Rumah Sakit Dr. Soetomo 2006. Hasil analisis kesesuaian terapi pada angina pektoris tidak stabil : tiga (27,27%) dari sebelas jenis obat yang digunakan memiliki kesesuaian dosis terhadap Standar Diagnosis dan Terapi Rumah Sakit Dr. Soetomo 2006. Hasil analisis kesesuaian terapi pada angina pektoris variant : tiga jenis obat (100%) dari tiga obat yang digunakan memiliki kesesuaian dosis terhadap Standar Diagnosis dan Terapi Rumah Sakit Dr. Soetomo 2006.

Kata kunci : angina pektoris, pola penggunaan obat, kesesuaian dosis.