

**KESESUAIAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIKA PADA PENDERITA  
DEMAM TIFOID RAWAT INAP ANAK DI RUMAH SAKIT SURABAYA  
INTERNASIONAL DIBANDINGKAN DENGAN PEDOMAN TERAPI  
DARI WHO TAHUN 2003 SELAMA PERIODE JANUARI-JUNI 2007**

Sri Hastanto, 2009

Pembimbing: (I) Hartono Tanto, (II) Eko Setiawan

**ABSTRAK**

Telah dilakukan penelitian mengenai "Kesesuaian Penggunaan Antibiotik Pada Penderita Demam Tifoid Rawat Inap Anak Di RS Surabaya Internasional Dibandingkan Dengan Pedoman Terapi Dari WHO Tahun 2003 Selama Periode Januari-Juni 2007". Penelitian ini adalah penelitian non-experimental yang dianalisis secara deskriptif dan bersifat retrospektif. Sebagai bahan penelitian digunakan data rekam medik anak dengan diagnosis utama awal dan atau akhir demam tifoid, dan didapatkan 42 sampel yang merupakan keseluruhan populasi. Jenis kelamin penderita: laki-laki 59,52%, perempuan 40,48% dengan usia terbanyak 5-14 tahun 57,14%, jenis terapi antibiotik yang diterima penderita demam tifoid jenis tunggal (30,95%) lebih kecil dari jenis kombinasi (69,05%), jenis antibiotik terbanyak thiamphenicol 54,10%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kesesuaiannya jenis 28,56%, kesesuaian dosis 33,32%, kesesuaian lama pemberian 8,33%.

**Kata kunci:** demam tifoid, kesesuaian penggunaan antibiotika, penderita anak