

Kajian Penggunaan Antibiotik pada *Neonatus Intensive Care Unit* di Sebuah Rumah Sakit Pemerintah di Surabaya

Felix Hidayat¹, Adji P. Setiadi^{1,2}, Eko Setiawan^{1,2}

¹Departemen Farmasi Klinis dan Komunitas, Fakultas Farmasi, Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia, ²Pusat Informasi Obat dan Layanan Kefarmasian (PIOLK), Fakultas Farmasi, Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Penggunaan antibiotik menjadi salah satu terapi yang banyak diberikan pada bayi di *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU). Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui profil dan mengkaji biaya, ketepatan dan ketercampuran atau kompatibilitas penggunaan antibiotik pada pasien di NICU salah satu rumah sakit pemerintah di Surabaya dalam kurun waktu November–Desember 2015. Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang yang dilakukan secara prospektif dengan memanfaatkan data rekam medis sebagai sumber data utama. Seluruh informasi yang diperoleh dari pasien NICU yang menggunakan antibiotik dan masuk dalam kriteria inklusi dan eksklusi dianalisis secara deskriptif. Total 32 orang pasien dilibatkan dalam penelitian ini. Penggunaan antibiotik terdiri dari 25 kali penggunaan antibiotik tunggal dan 14 kali penggunaan antibiotik kombinasi. Ampisilin merupakan antibiotik tunggal yang paling banyak digunakan, sedangkan penggunaan antibiotik kombinasi terbanyak adalah penggunaan kombinasi ampicilin dan gentamisin. Dari total seluruh pasien, hanya terdapat 13 pasien dengan diagnosis infeksi dan hanya 2 pasien (15,38%) yang mendapat terapi antibiotik yang tepat. Proses pergantian terapi didominasi oleh proses de-escalasi yaitu sebesar 44,44%. Berdasarkan analisis kompatibilitas, terdapat banyak pencampuran sediaan antibiotik intravena yang tidak dapat diklasifikasikan *compatible* atau *not compatible* akibat tidak tersedianya informasi terkait kompatibilitasnya. Biaya penggunaan antibiotik yang harus dikeluarkan pasien rata-rata sebesar Rp265.252,00 (*min–max*= Rp16.100,00 s.d. Rp2.091.590,00). Ketepatan penggunaan antibiotik di ruang NICU perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk meminimalkan risiko dampak negatif khususnya peningkatan biaya dan risiko resistensi.

Kata kunci: Biaya antibiotik, kajian penggunaan antibiotik, kompatibilitas, *neonatal intensive care unit*

Antibiotics Utilization Review in a Neonate Intensive Care Unit of a Public Hospital in Surabaya

Abstract

Antibiotic is frequently used in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU). The aim of this study was to identify the usage pattern and to review the cost, appropriateness, and compatibility of antibiotics given to the patients in the NICU of one public hospital in Surabaya during November to December 2015. This was a cross-sectional study using medical record as the main source of the data. All information about eligible patients receiving antibiotics in the NICU was analysed descriptively. A total of 32 patients was involved in this study. The antibiotics utilization profile consisted of 25 single and 14 combination therapy. Ampicillin and ampicillin-gentamycin were found as the most frequently used in the single and combination therapy, consecutively. From all patients received antibiotics, 13 patients had confirmed with infections problem and only 2 patients (15.38%) received appropriate antibiotics therapy. From all therapeutic modification made, 44.44% was de-escalation. According to the compatibility analysis, lots of antibiotic intravenous admixtures in this research could not be clearly identified as compatible or not compatible because no information was available. The average cost of antibiotics per patient was IDR 265,252 (range IDR 16,100 to IDR 2,091,500). There is a need to optimize the use of antibiotics in the NICU in order to minimize the risk of adverse outcomes especially the increased cost and risk of resistance.

Keywords: Antibiotics utilization review, compatibility, cost of antibiotics, neonatal intensive care unit

Korespondensi: Eko Setiawan, M.Sc., Apt., Pusat Informasi Obat dan Layanan Kefarmasian (PIOLK), Fakultas Farmasi, Universitas Surabaya, Surabaya, Jawa Timur 60923, Indonesia, *email*: ekosetiawan.apt@gmail.com

Naskah diterima: 11 Juni 2018, Diterima untuk diterbitkan: 18 Februari 2019, Diterbitkan: 1 Maret 2019

Pendahuluan

Kematian pada bayi dan anak-anak dapat disebabkan oleh berbagai hal, dan salah satu penyebab terbesar adalah infeksi.¹⁻³ Sebuah penelitian yang dilakukan di berbagai negara di dunia menunjukkan pneumonia menjadi penyebab kematian terbesar kedua pada bayi dan anak-anak yang berusia di bawah usia 5 tahun.² Penelitian lain yang dilakukan di Brazil juga menunjukkan besarnya kematian yang disebabkan oleh infeksi pada anak dalam hal ini adalah bayi. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa sebanyak 229 dari total 745 kematian bayi yang dirawat di *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) adalah disebabkan oleh sepsis.³ Salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kematian pada anak dan bayi adalah penggunaan antibiotik yang tidak tepat, yang dapat berupa pemilihan jenis yang salah atau pengaturan dosis regimen yang tidak tepat.⁴

Bayi bukan merupakan orang dewasa dalam ukuran kecil karena fisiologis bayi memiliki banyak perbedaan dibandingkan dengan orang yang telah dewasa. Beberapa perbedaan yang dapat dijumpai antara bayi dan orang dewasa antara lain: 1) fungsi organ untuk ekskresi, yaitu ginjal dan hepar, belum sempurna; 2) komposisi cairan tubuh pada bayi per kg berat badan lebih besar jika dibandingkan dengan orang dewasa; 3) jumlah protein, khususnya albumin, belum sebanyak orang dewasa.^{5,6} Salah satu dampak dari perbedaan tersebut yaitu adanya perbedaan profil farmakokinetik (*pharmacokinetic*; PK) yang seharusnya dapat diantisipasi oleh tenaga kesehatan pada saat memberikan dosis antibiotik. Kegagalan melakukan antisipasi dapat meningkatkan risiko terjadinya kegagalan untuk mencapai efek terapeutik serta meningkatkan risiko terjadinya reaksi obat yang tidak dikehendaki (ROTD).^{7,8}

Beberapa bukti penelitian menunjukkan besarnya permasalahan terkait ketidaktepatan

penggunaan antibiotik pada bayi dan anak-anak. Sebuah penelitian yang dilakukan di Taiwan menunjukkan hasil bahwa penundaan penggunaan antibiotik yang tepat pada pasien dengan *multiple drug resistant Acinetobacter baumanii* menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kematian bayi di NICU.⁹ Selain berdampak pada peningkatan risiko terjadinya kegagalan terapi, salah satu dampak yang perlu diwaspadai adalah potensi terjadinya resistensi ketika antibiotik yang diberikan tidak dapat mencapai kadar minimum untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri. Fenomena resistensi antibiotik merupakan salah satu permasalahan yang banyak dialami di NICU. Sebuah studi yang dilakukan di India menunjukkan bahwa antibiotik yang pada umumnya merupakan terapi lini pertama pengobatan infeksi pada neonatus seperti ampicilin dan seftriakson memiliki sensitivitas yang buruk terhadap sebagian besar organisme penyebab infeksi, atau dengan kata lain telah diklasifikasikan resisten.¹⁰ Beberapa bukti penelitian lainnya yang dilakukan pada *setting* NICU juga menekankan ancaman permasalahan terkait dengan penurunan sensitivitas patogen terhadap antibiotik lini pertama.^{11,12}

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tidak terdapat penelitian terpublikasi dengan *setting* NICU di Indonesia yang ditujukan untuk melihat profil ketepatan penggunaan antibiotik. Beberapa penelitian di Indonesia ditujukan untuk mengidentifikasi: 1) epidemiologi infeksi dan profil penggunaan antibiotik pada suatu diagnosis tertentu; 2) profil sensitivitas patogen terhadap antibiotik.¹³⁻¹⁶ Ketepatan penggunaan antibiotik pada pasien rawat inap NICU di Indonesia penting untuk diteliti khususnya di era implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mengetahui ketercukupan dan ketepatan alokasi anggaran yang disediakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji profil, biaya, dan ketepatan penggunaan antibiotik pada pasien NICU di sebuah rumah sakit

pemerintah di Surabaya.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang yang dilakukan setelah mendapatkan izin pengambilan data dari rumah sakit dengan nomor surat 070/14640/436.7.8/2015. Rumah sakit tempat pengambilan data merupakan rumah sakit milik pemerintah yang menjadi salah satu rujukan penanganan pasien yang ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan Nasional. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah pasien NICU yang mendapat antibiotik selama periode November–Desember 2015.

Pengambilan data penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, antara lain: 1) mencatat data yang terdapat dalam catatan rekam medis; 2) melakukan pengamatan secara langsung terhadap pasien; dan 3) melakukan konfirmasi kepada tenaga kesehatan lain apabila terdapat data yang tidak dimengerti atau data tidak terbaca. Parameter yang didokumentasikan dan dianalisis pada penelitian ini antara lain: 1) karakteristik pasien (umur, jenis kelamin, lama perawatan pasien, diagnosis dokter, hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan fisik, hasil kultur bakteri, hasil terapi setelah mendapatkan perawatan), 2) karakteristik antibiotik (golongan dan jenis, kombinasi, rute pemberian, dosis beserta frekuensi, lama pemberian per administrasi, durasi pemberian selama perawatan, pergantian dosis regimen antibiotik); 3) profil kompatibilitas sediaan intravena (iv); 4) proses pergantian terapi antibiotik; 5) biaya penggunaan antibiotik; serta 6) ketepatan penggunaan antibiotik. Data lalu dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan nilai rata-rata/*mean* (\bar{x}) dan/atau dengan menggunakan bentuk persentase.

Di dalam penelitian ini, diagnosis yang diberikan oleh dokter dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu: 1) diagnosis masuk, 2) diagnosis kerja; serta 3) diagnosis keluar. Diagnosis masuk didefinisikan sebagai diagnosis yang

diberikan oleh dokter saat pasien pertama kali masuk ruang NICU. Diagnosis kerja adalah diagnosis selama menjalani rawat inap yang diberikan oleh dokter setelah melihat berbagai hasil pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan fisik. Diagnosis keluar merupakan diagnosis yang diberikan oleh dokter saat pasien keluar dari ruang NICU.

Analisis kompatibilitas dan inkompatibilitas dilakukan pada pencampuran antara sediaan antibiotik dengan antibiotik lain, antara sediaan antibiotik dengan obat lain, serta antara sediaan antibiotik dengan pelarut. Analisis yang telah dilakukan digolongkan ke dalam beberapa jenis hasil, antara lain yaitu kompatibel (K), inkompatibel (I), tidak terdapat informasi yang tersedia (*no information*; NI), serta tidak dapat diaplikasikan (*not applicable*; NA). Analisis dilakukan dengan menggunakan dua literatur sebagai acuan, yaitu: 1) *Handbook on Injectable Drugs* edisi 17 tahun 2013;¹⁷ dan 2) brosur sediaan antibiotik terkait. Pembuatan kesimpulannya antara lain sebagai berikut: 1) campuran dinyatakan kompatibel apabila pada buku referensi dan/atau brosur dari pabrik pembuat sediaan disimpulkan dengan jelas bahwa campuran tersebut K; 2) campuran dinyatakan inkompatibel apabila pada buku referensi dan/atau brosur disimpulkan dengan jelas campuran tersebut ialah I; 3) campuran dinyatakan NI apabila pada buku referensi dan/atau brosur tidak ditemukan informasi mengenai profil kompatibilitas campuran tersebut; 4) campuran dinyatakan NA apabila pada buku referensi dan/atau brosur terdapat perbedaan informasi.

Proses pergantian terapi antibiotik pada penelitian ini digolongkan menjadi 3, yaitu: 1) proses eskalasi; 2) proses de-eskalasi; 3) proses pergantian rute dari rute intravena menjadi per oral (*iv to oral*). Proses eskalasi pada penelitian ini didefinisikan sebagai suatu proses penambahan antibiotik pada pasien yang telah mendapatkan antibiotik ataupun

digantinya suatu antibiotik dengan antibiotik baru yang memiliki aktivitas antibakteri yang lebih luas (*narrow spectrum* menjadi *broad spectrum*). Suatu proses pergantian terapi disebut proses de-eskalasi apabila dilakukan beberapa hal sebagai berikut: 1) pergantian antibiotik dari antibiotik dengan aktivitas antibakteri luas ke sempit (*broad spectrum* ke *narrow spectrum*); 2) pengurangan jumlah antibiotik yang digunakan; 3) penurunan dosis antibiotik; 4) penurunan frekuensi antibiotik; dan 5) penghentian terapi antibiotik apabila tidak ditemukan adanya infeksi. Penggunaan kombinasi antibiotik golongan beta laktam dengan beta laktamase tidak diklasifikasikan sebagai bentuk kombinasi pada penelitian ini. Perubahan terapi antibiotik yang dilakukan sebagai bentuk transisi, yaitu terjadi hanya pada 1 hari pemberian, tidak diklasifikasikan sebagai eskalasi atau de-eskalasi.

Biaya yang dihitung pada penelitian ini adalah biaya penggunaan antibiotik selama pasien menjalani rawat inap. Biaya jasa dokter, penggunaan obat lainnya, serta pemeriksaan laboratorium tidak dihitung dalam penelitian ini. Perspektif pasien digunakan sebagai dasar dari penghitungan biaya pada penelitian ini dan data *billing* yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit kepada pasien digunakan sebagai sumber utama analisis biaya. Tidak dilakukan penyesuaian menggunakan laju inflasi pada penelitian ini karena data biaya dan analisis dilakukan pada tahun yang sama.

Analisis ketepatan penggunaan antibiotik pada penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan regimen terapi pasien terhadap pedoman terapi *Infectious Disease Society of America* (IDSA) terbaru. Literatur *Pediatric & Neonatal Dosage Handbook* edisi 2018 digunakan sebagai acuan pendukung apabila tidak didapatkan informasi yang diperlukan di literatur acuan yang utama, seperti dosis. Terdapat tiga klasifikasi ketepatan penggunaan antibiotik pada penelitian ini, yaitu tepat seluruhnya, tepat sebagian, dan tidak tepat

sama sekali. Suatu pemberian antibiotik disebut sebagai tepat seluruhnya apabila jenis, dosis, dan frekuensi pemberian antibiotik tersebut tepat seluruhnya.¹⁹ Pemberian antibiotik disebut sebagai tepat sebagian bila diberikan jenis antibiotik yang tepat namun dengan dosis atau frekuensi yang tidak tepat, sedangkan apabila pemberian jenis antibiotik tidak tepat maka pemberian antibiotik dianggap tidak tepat tanpa harus memperhatikan dosis dan frekuensi yang diberikan. Analisis kesesuaian antibiotik ini dilakukan pada pasien dengan diagnosis kerja infeksi saja.

Hasil

Total terdapat 32 pasien NICU selama periode pengambilan data pasien yang dilibatkan dalam penelitian ini (Tabel 1). Uji kultur mikroba dan sensitivitas tidak dilakukan pada pasien NICU dalam penelitian ini. Diagnosis kerja dan diagnosis keluar pasien NICU memiliki hasil yang sama. Terdapat 13 pasien (40,63%) dari total 32 pasien yang mendapatkan diagnosis infeksi. Dengan kata lain, 19 pasien (59,37%) lainnya tidak diketahui informasi diagnosis infeksi baik pada diagnosis masuk maupun kerja. Akan tetapi, pada 19 pasien tanpa disertai informasi diagnosis terkait infeksi tersebut memiliki satu atau beberapa tanda infeksi seperti peningkatan nilai *white blood cell* (WBC), *C-reactive protein* (CRP), suhu badan, denyut nadi, dan/atau laju nafas. Di antara 13 pasien dengan diagnosis infeksi, hanya 11 pasien (84,62%) yang mendapatkan diagnosis masuk infeksi sedangkan 2 pasien (15,38%) sisanya masuk ruang NICU tanpa diagnosis masuk infeksi. Detail diagnosis pasien dijabarkan pada Gambar 1.

Antibiotik yang digunakan pada penelitian ini tidak hanya antibiotik tunggal, melainkan juga antibiotik kombinasi. Terdapat 25 kali penggunaan antibiotik tunggal dan 14 kali penggunaan antibiotik kombinasi, dan 1 orang pasien dapat mendapatkan lebih dari 1

Tabel 1 Data Karakteristik Pasien yang Mendapatkan Antibiotik di Ruang NICU

Karakteristik Pasien	Nilai	Percentase (%)
Usia Pasien ($mean \pm SD$, dalam satuan hari)	$0,78 \pm 2,38$ Min–maks: 0–12	-
Jenis Kelamin		
Laki-laki	23	71,88
Perempuan	9	28,12
Total	32	100,00
Lama Perawatan Pasien ($mean \pm SD$, dalam satuan hari)	$11,44 \pm 8,94$ Min–maks: 2–33	-
Hasil Terapi Pasien		
Membaik	28	87,50
Memburuk	0	0,00
Meninggal	2	6,25
Dirujuk	2	6,25
Total	32	100,00


Keterangan: Min=minimal; Maks=maksimal; Penghitungan persentase dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

% nilai=jumlah nilai pasien pada tiap karakteristik dibagi jumlah total pasien x 100%

jenis penggunaan antibiotik tunggal maupun kombinasi. Jenis dan golongan dari antibiotik ditampilkan pada Tabel 2. Profil lengkap dosis dan frekuensi penggunaan untuk masing-masing antibiotik akan dijabarkan pada Tabel 3. Rata-rata dari durasi penggunaan antibiotik adalah sebesar $5,08 \pm 2,07$ hari dan seluruh antibiotik diberikan secara iv *intermittent* dengan

lama pemberian selama 10–15 menit untuk tiap kali pemberian.

Total terdapat 47 campuran antara antibiotik dengan pelarut yang dianalisis dalam penelitian ini. Pelarut antibiotik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *aqua bidestilata* yang kemudian diencerkan kembali dengan pelarut PZ (NaCl 0,9%). Analisis kompatibilitas-

**Gambar 1 Diagnosis Masuk dan Kerja/Keluar Pasien NICU dengan Diagnosis Infeksi**

Keterangan: NS=Not specified (pada diagnosis dokter tertulis jelas infeksi atau risiko tinggi infeksi tanpa ada keterangan lebih detail terkait jenis infeksinya)

inkompatibilitas sediaan antibiotik intravena dengan sediaan lainnya dijabarkan pada Tabel 4. Pada penelitian ini ditemukan campuran antibiotik dengan pelarut tanpa informasi (*no information*) ketercampuran yaitu sebanyak 6 untuk pelarut PZ dan 47 untuk pelarut *aqua bidestilata*.

Proses pergantian terapi terjadi pada 6 pasien dengan total terdapat 9 kali proses pergantian terapi. Detail dari proses pergantian terapi dapat dilihat pada Tabel 5. Proses penggantian terapi antibiotik dari iv ke oral tidak ditemukan dalam penelitian ini.

Rata-rata biaya yang dikeluarkan pasien untuk penggunaan antibiotik pada penelitian ini sebesar Rp265.252,00 dengan standar deviasi (SD) sebesar Rp481.535,00. Biaya terbesar yang dikeluarkan sebesar Rp2.091.590,00 sedangkan biaya yang terkecil yaitu sebesar Rp16.100,00. Pasien dengan biaya terbesar menggunakan sebanyak tiga jenis antibiotik

selama perawatannya yaitu ampisilin, gentamisin dan meropenem yang seluruhnya merupakan antibiotik generik. Ampisilin digunakan selama 5 hari, gentamisin digunakan selama 3 hari dan meropenem digunakan selama 17 hari.

Analisis kesesuaian antibiotik dilakukan pada 13 pasien yang mendapatkan diagnosis infeksi saja. Hasilnya, hanya terdapat 2 pasien (15,38%) yang diklasifikasikan sebagai pasien dengan terapi antibiotik yang tepat seluruhnya. Detail dari analisis kesesuaian penggunaan antibiotik dijabarkan pada Tabel 6. Terdapat 1 orang pasien yang mendapatkan antibiotik yang tidak tepat sama sekali.

Pembahasan

Terdapat 5 jenis antibiotik yang digunakan di NICU pada penelitian ini, yaitu ampisilin, gentamisin, meropenem, sefotaksim, dan kloksasilin, namun penggunaan terbanyak

Tabel 2 Data Karakteristik Penggunaan Antibiotik Berdasarkan *Anatomical Therapeutics Chemical (ATC) Classification of World Health Organization (WHO)* (Revisi 2015)

Antibiotik	Penggunaan	Percentase (%)
Antibiotik Tunggal		
1. Penisilin <i>Extended Spectrum Penicillin</i> Ampisilin	15	60,00
2. Sefalosporin Sefalosporin generasi ketiga Sefotaksim	4	16,00
3. Karbapenem Meropenem	6	24,00
Total	25	100,00
Antibiotik Kombinasi		
1. Berdasarkan golongan antibiotik Penisilin & penisilin Penisilin & aminoglikosida Penisilin & sefalosporin generasi 3 Penisilin & aminoglikosida & sefalosporin generasi 3	1 10 1 2	7,14 71,43 7,14 14,29
Total	14	100,00
2. Berdasarkan jenis antibiotik Ampisilin & kloksasilin Ampisilin & gentamisin Ampisilin & sefotaksim Ampisilin & gentamisin & sefotaksim	1 10 1 2	7,14 71,43 7,14 14,29
Total	14	100,00

Tabel 3 Data Dosis Antibiotik dan Frekuensi Pemberian pada Pasien NICU

Antibiotik	Dosis (mg) / Kali Pemberian	Frekuensi Pemberian	Jumlah Pasien (n)
Ampisilin	1. 75	2x/hari	1
	2. 100	2x/hari	6
	3. 125	2x/hari	7
	4. 150	2x/hari	8
	5. 175	2x/hari	2
	6. 200	2x/hari	1
	7. 250	2x/hari	1
	<i>Mean = 136,54; Min-Max = 75–250</i>		
Sefotaksim	1. 100	2x/hari	1
	2. 125	2x/hari	1
	3. 175	2x/hari	1
	4. 250	2x/hari	1
<i>Mean = 162,5; Min-Max = 100–250</i>			
Kloksasilin	1. 75	2x/hari	1
<i>Mean = 75</i>			
Gentamisin	1. 10	1x/hari	4
	2. 12	1x/hari	1
	3. 15	1x/hari	4
	4. 20	1x/hari	1
<i>Mean = 13,2; Min-Max = 10–20</i>			
Meropenem	1. 20	3x/hari	2
	2. 35–25	3x/hari	1
	3. 50	3x/hari	2
	4. 100	3x/hari	1
<i>Mean = 42,86; Min-Max = 20–100</i>			

Keterangan: *max*=nilai terbesar; *min*=nilai terkecil; n=jumlah pasien yang menerima terapi antibiotik dengan dosis tersebut

yaitu jenis ampisilin, sefotaksim, dan gentamisin. Tingginya frekuensi penggunaan ketiga jenis antibiotik tersebut dapat dipahami dengan mempertimbangkan luasnya spektrum aktivitas antibiotik tersebut. Penggunaan dari antibiotik spektrum luas pada terapi empiris dilakukan sebab pada saat tersebut belum diketahui secara pasti patogen penyebab infeksi.

Profil penggunaan antibiotik pada hasil penelitian ini serupa dengan beberapa penelitian

terpublikasi dari negara lain. Penelitian yang dilakukan di negara Amerika Serikat, Kanada dan Arab Saudi, menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis obat yang paling sering digunakan di ruang NICU, dan dua di antaranya adalah antibiotik yaitu ampisilin dan gentamisin yang diberikan pada 1.691 bayi dan 1.667 bayi, secara berturut-turut.²⁰ Hasil dari sebuah kajian sistematis yang dilakukan dengan memanfaatkan sebanyak empat buah *database*

Tabel 4 Data Kompatibilitas dan Inkompatibilitas Antibiotik dengan Pelarut pada Ruang NICU

Hasil Analisis	Pelarut	
	PZ (NaCl 0,9%)	Aqua Bidestilata
Kompatibel	41 (87,23)	0 (0,00)
Inkompatibel	0 (0,00)	0 (0,00)
No Information	6 (12,77)	47 (100,00)
Not Applicable	0 (0,00)	0 (0,00)
Total	47 (100,0)	47 (100,00)

Tabel 5 Data Proses Pergantian Terapi

Proses pergantian	Nilai	Percentase (%)
Proses eskalasi	2	22,22
Proses de-eskalasi	4	44,44
Proses pergantian terapi dari rute IV ke oral	0	0,00
Proses transisi	3	33,33
Total	9	100,00

Keterangan: IV: intravena; penghitungan persentase dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

% nilai = jumlah proses pergantian terapi antibiotik dibagi total proses pergantian terapi antibiotik (9 proses) x 100%

juga menegaskan bahwa antibiotik ampicilin dan gentamisin merupakan antibiotik yang paling sering diresepkan di ruang NICU.²¹ Pada dasarnya, meropenem juga memiliki spektrum aktivitas yang luas, namun tidak banyaknya penggunaan meropenem di dalam penelitian ini dapat disebabkan oleh adanya batasan penggunaan meropenem yang terdapat pada Formularium Nasional (Fornas).²² Seiring dengan minimnya frekuensi dari penggunaan meropenem diharapkan dapat berakibat pada penurunan dari temuan patogen yang resisten terhadap golongan karbapenem yang dalam beberapa tahun terakhir dilaporkan sebagai suatu ancaman dalam dunia kesehatan global termasuk di ruang ICU untuk anak. Sebuah penelitian yang dilakukan di 6 *Pediatric* ICU di negara Vietnam menunjukkan betapa banyaknya temuan berbagai *Carbapenem*

resistant pathogen. Hasil dari uji mikrobiologi menunjukkan isolat *Klebsiella pneumonia*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter baumanii* yaitu sebanyak 55%, 71%, dan 65%, secara berturut-turut, resisten terhadap antibiotik golongan karbapenem.²³ Munculnya resistensi terhadap golongan karbapenem menyebabkan semakin terbatasnya pilihan terapi yang dimiliki pasien dan beberapa di antaranya memiliki harga yang relatif mahal seperti *tigecycline* dan doripenem.²⁴⁻²⁶

Tingginya penggunaan antibiotik dengan spektrum luas, walaupun sangat diperlukan, dapat memiliki dampak pada munculnya kasus infeksi oleh bakteri dengan *extended spectrum beta-lactamase* (ESBL) sebuah enzim yang dapat memotong cincin beta-laktam pada hampir seluruh antibiotik golongan beta-laktam.²⁷⁻²⁹ Selain memiliki dampak terhadap

Tabel 6 Data Analisis Kesesuaian Penggunaan Antibiotik Pasien NICU

Kategori	Pasien (orang)	Percentase (%)
Seluruh terapi AB tepat	2	15,38
Sebagian terapi AB tepat		
1. Frekuensi tidak tepat ^a	7	53,86
2. Dosis dan frekuensi tidak tepat ^b	1	7,69
3. Tidak tepat dengan catatan ^c	2	15,38
Terapi AB tidak tepat ^d	1	7,69
Total	13	100,00

Keterangan: AB=antibiotik; NICU=Neonatal Intensive Care Unit; penghitungan persentase dilakukan dengan rumus sebagai berikut: jumlah pasien dalam suatu hasil analisis kesesuaian dibagi jumlah total pasien dengan diagnosis infeksi (13 pasien) x 100%; untuk pasien yang mengalami perubahan diagnosis (pasien no. 4), penggunaan antibiotik dianggap tidak tepat apabila ada ketidaktepatan pada salah satu diagnosis.

^aPenggunaan ampicilin hanya 2x/hari (n=5); penggunaan ampicilin dan sefotaksim hanya 2x/hari (n=1); pasien dengan diagnosis sepsis hanya diberikan ampicilin dan diberikan hanya 2x/hari (n=1); ^bDosis meropenem kurang dan frekuensi ampicilin hanya 2x/hari pada 1 orang pasien; ^cSatu pasien diberikan jenis antibiotik yang melebihi yang dibutuhkan dan 1 pasien diberikan frekuensi anitibiotik yang melebihi yang diperlukan; ^dDiagnosis sepsis neonatus diberikan kombinasi ampicilin (frekuensi ampicilin kurang, hanya 2x/hari) dan kloksasilin.

munculnya ESBL, pemberian dari antibiotik dengan spektrum luas yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan risiko terjadinya supra infeksi oleh *Clostridium difficile*.³⁰⁻³² Dengan mempertimbangkan besarnya risiko adanya infeksi ESBL dan *Clostridium difficile*, diharapkan penggunaan antibiotik spektrum luas dapat diubah menjadi antibiotik dengan spektrum yang lebih sempit sesuai dengan penyebab infeksi setiap pasien. Sayangnya, pemeriksaan kultur bakteri tidak ditemukan pada penelitian ini. Minimnya pemeriksaan kultur bakteri tidak hanya ditemukan dalam penelitian ini, akan tetapi juga pada beberapa penelitian lain di Indonesia.³³⁻³⁵ Salah satu pertimbangan utama tidak dilakukannya pemeriksaan kultur bakteri adalah biaya dan lamanya waktu tunggu untuk mendapatkan hasil kultur. Oleh karena itu, sangat diharapkan institusi pendidikan tinggi di Indonesia dengan didukung oleh pemerintah Indonesia dapat mengupayakan tersedianya alat yang dapat mengidentifikasi patogen penyebab infeksi secepat dan semurah mungkin.

Proses pergantian terapi pada penelitian ini yang paling banyak ditemukan adalah praktik de-eskalasi antibiotik. Praktik de-eskalasi antibiotik merupakan salah satu strategi dalam mengurangi penggunaan antibiotik spektrum luas yang memiliki dampak pada penurunan angka kejadian infeksi oleh *multiple drug resistance (MDR) pathogens*.³⁶ Implementasi de-eskalasi juga ditemukan dalam penelitian terpublikasi lain, dan hasilnya menunjukkan bahwa implementasi intervensi pengubahan terapi antibiotik yang salah satunya berupa de-eskalasi tidak berdampak buruk terhadap pasien.³⁷ Walaupun demikian, praktik dari de-eskalasi pada pasien bayi perlu mendapat perhatian dan pemantauan yang serius dengan mempertimbangkan belum sempurnanya sistem kekebalan pada tubuh bayi. Sebelum diputuskan untuk melakukan de-eskalasi, perlu dipertimbangkan keseimbangan antara dampak positif mengurangi risiko ROTD

pada bayi serta upaya meminimalkan potensi terjadinya resistensi dan risiko kegagalan mencapai efektivitas pada bayi.

Pada penelitian ini, hanya ditemukan dua pasien yang tepat seluruh kriteria pemberian antibiotik dan terdapat satu orang pasien yang tidak tepat sama sekali. Mayoritas dari pasien dikategorikan mendapatkan terapi antibiotik yang sebagian tepat. Ketidaktepatan paling banyak ditemukan pada frekuensi pemberian antibiotik. Antibiotik yang masuk golongan β -lactam dalam penelitian ini, yakni ampisilin dan sefotaksim, berapapun dosisnya selalu diberikan dengan frekuensi dua kali per hari. Antibiotik golongan β -lactam merupakan golongan antibiotik *time-dependent*, yang berarti bahwa kemampuan membunuh bakteri dari golongan obat ini sangat ditentukan oleh lama kadar antibiotik berada di atas nilai kadar minimum yang dibutuhkan untuk menghambat pertumbuhan bakteri (*minimum inhibitory concentration; MIC*).^{38,39} Target dari terapi antibiotik *time-dependent* yaitu $T_{>\text{MIC}}$ yang berarti durasi waktu kadar antibiotik berada diatas nilai MIC diupayakan harus selama mungkin. Semakin lama kadar dari antibiotik golongan β -lactam berada di atas nilai MIC, maka semakin besar efektivitas untuk membunuh patogen. Terdapat dua acara pemberian antibiotik golongan *time-dependent* untuk memaksimalkan ketercapaian target farmakokinetik-farmakodinamik; (*pharmacokinetic-pharmacodynamic*, PK-PD), yakni pemberian harus sesering mungkin atau menggunakan metode *continuous infusion*.⁴⁰ Frekuensi pemberian ampisilin dan sefotaksim sebanyak dua kali sudah tepat hanya untuk bayi yang masih berusia <1 minggu.^{18,41} Pada penelitian ini, terdapat bayi dengan usia lebih dari 1 minggu sehingga seharusnya diberikan dengan frekuensi 3 kali per hari atau setiap 8 jam. Bahkan, pada bayi yang berusia lebih dari 4 minggu, disarankan frekuensi pemberian kedua jenis antibiotik tersebut setiap 6 jam.^{18,41}

Semua pemberian gentamisin di NICU

dilakukan/diberikan 1 kali sehari atau secara *once daily dosing regimen* (OD). Berdasarkan referensi, pemberian gentamisin dianjurkan untuk diberikan satu kali sehari atau *once dose daily*.⁴² Pemberian dosis satu kali per hari pada antibiotik gentamisin dapat diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik antibiotik tersebut yang berupa *concentration-dependent antibiotic*. Antibiotik dengan karakteristik tersebut mempunyai aktivitas optimal dalam menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri yang sangat ditentukan oleh adanya ketercapaian konsentrasi maksimum (C_{max}) dalam darah. Salah satu target terapi PK-PD yang merepresentasikan keberhasilan terapi secara klinis dan mikrobiologis gentamisin adalah rasio antara konsentrasi maksimum dibandingkan dengan MIC, atau disingkat C_{max}/MIC .^{43,44} Namun demikian, pemberian dari gentamisin secara OD perlu diwaspadai dengan mempertimbangkan indeks terapi yang relatif sempit dan potensi menimbulkan nefrotoksitas dan ototoksitas seperti pada antibiotik golongan *amynoglicosides* lainnya.^{45,46} Oleh karena itu, pemantauan kadar gentamisin di dalam darah sangat diperlukan untuk mengoptimalkan ketercapaian efek terapeutik dan meminimalkan risiko terjadi reaksi obat yang tidak dikehendaki.

Kombinasi yang paling banyak digunakan di ruang NICU adalah kombinasi ampisilin dan gentamisin yang digunakan sebanyak 10 kali. Penggunaan kombinasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan efek sinergis dari keduanya di dalam menghambat bakteri seperti *Streptococcus*, *Enterococci*, *Listeria monocytogenes*, dan beberapa jenis *Enterobacteriaceae*, seperti *Enterocobacter spp.*, *Proteus spp.*, *Escherichia coli*. Selain keefektifannya, penggunaan dari kombinasi ampisilin dan gentamisin juga banyak terjadi sebab kombinasi ini mudah didapatkan dan harganya terjangkau sehingga cocok digunakan pada negara-negara berkembang.⁴⁷

Pada penelitian ini sebagian besar terapi

antibiotik diberikan kepada pasien dengan diagnosis yang tertulis di dalam catatan rekam medis tidak spesifik terkait infeksi sehingga penggunaan antibiotik pada pasien tersebut tidak dapat dinilai ketepatan penggunaannya berdasarkan pedoman terapi. Dengan kata lain, sebagian besar antibiotik pada penelitian ini diberikan dengan mempertimbangkan penyimpangan nilai hasil uji laboratorium, khususnya nilai CRP dan WBC. Penggunaan antibiotik pada bayi yang mempunyai nilai abnormal pada kedua parameter tersebut tidak dapat disalahkan. Pada suatu penelitian terpublikasi yang dilakukan secara retrospektif pada pasien *infant* dengan usia di bawah 90 hari menunjukkan bahwa penggunaan nilai CRP dapat menjadi salah satu prediktor di dalam mendiagnosis infeksi bakteri serius dan secara signifikan lebih baik digunakan sebagai *diagnostic marker* dibanding sebagai karakteristik klinis apabila dibanding dengan tes *absolute neutrophil count* (ANC) dan WBC.⁴⁸ Pemantauan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium perlu dilakukan secara teratur dan berkesinambungan, serta penggunaan antibiotik sebaiknya dihentikan atau dilakukan de-eskalasi pemberian antibiotik apabila keadaan pasien sudah membaik. Penghentian penggunaan antibiotik tersebut perlu untuk dilakukan sebagai upaya untuk meminimalkan terjadinya reaksi obat yang tidak dikehendaki, meminimalkan timbulnya kasus resistensi patogen, dan untuk mencegah pembengkakan biaya pengobatan. Apabila tidak dihentikan sesegera mungkin, salah satu akibat atau konsekuensi yang langsung dapat dirasakan adalah tidak terkontrolnya pembiayaan antibiotik yang pada penelitian ini dapat mencapai Rp2.091.590,00.

Simpulan

Jenis antibiotik yang banyak digunakan di NICU pada penelitian ini adalah ampisilin, gentamisin, meropenem, sefotaksim, dan

kloksasilin baik dalam bentuk tunggal atau kombinasi. Antibiotik di ruang NICU pada penelitian ini sebagian besar diberikan dengan berdasarkan penyimpangan nilai pemeriksaan laboratorium yang belum disertai dengan diagnosis pasti terkait jenis infeksi yang diderita. Sebagai konsekuensi dari hal ini, analisis ketepatan hanya dapat dilakukan pada 13 orang pasien dengan hasil kajian yang menyatakan sebagian besar pasien belum mendapatkan terapi tepat pada seluruh aspek penilaian yang meliputi jenis, dosis, frekuensi. Pemantauan terhadap kondisi klinis dan hasil pemeriksaan laboratorium perlu untuk diupayakan sesering mungkin dan secara berkesinambungan sebagai dasar untuk mencegah penggunaan antibiotik yang berlebihan.

Pendanaan

Penelitian ini dilakukan secara mandiri dan tidak didanai oleh sumber hibah manapun.

Konflik Kepentingan

Peneliti menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan apapun pada penelitian ini.

Daftar Pustaka

1. Lanata CF, Fischer-Walker CL, Olascoaga AC, Torres CX, Aryee MJ, Black RE. Global causes of diarrheal disease mortality in children <5 years of age: A systematic review. *PLoS One*. 2013;8(9):e72788. doi: 10.1371/journal.pone.0072788
2. Liu L, Oza S, Hogan D, Perin J, Rudan I, Lawn JE, et al. Global, regional, and national causes of child mortality in 2000–13, with projections to inform post-2015 priorities: An updated systematic analysis. *Lancet*. 2015;385(9966):430–40. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61698-6
3. Alves JB, Gabani FL, Ferrari RAP, Tacla MTGM, Linck Júnior A. Neonatal sepsis: mortality in a municipality in southern Brazil, 2000 to 2013. *Rev Paul Pediatr*. 2018;36(2):132-40.
4. Levy ER, Swami S, Dubois SG, Wendt R, Banerjee R. Rates and appropriateness of antimicrobial prescribing at an academic children's hospital, 2007–2010. *Infect Control Hosp Epidemiol*. 2012;33(4):346–53. doi: 10.1086/664761.
5. Fernandez E, Perez R, Hernandez A, Tejada P, Arteta M, Tamos JT. Factors and mechanism for pharmacokinetic differences between pediatric population and adults. *Pharmaceutics*. 2011;3(1):53–72. doi: 10.3390/pharmaceutics3010053.
6. Ku LC, Smith PB. Dosing in neonates: Special considerations in physiology and trial design. *Pediatric Res*. 2015;77(1-1): 2–9. doi: 10.1038/pr.2014.143.
7. Johnson JK, Laughon MM. Antimicrobial agent dosing in infants. *Clin Ther*. 2016; 38(9):1948–60. doi: 10.1016/j.clinthera.2016.06.017.
8. Nunes BM, Xavier TC, Martins RR. Antimicrobial drug-related problems in a neonatal intensive care unit. *Rev Bras Ter Intensiva*. 2017;29(3):331–6. doi: 10.5935/0103-507X.20170040.
9. Wei HM, Hsu YL, Lin HC, Hsieh TH, Yen TY, Lin HC, et al. Multidrug-resistant *Acinetobacter baumanii* infection among neonates in a neonatal intensive care unit at a medical center in central Taiwan. *J Microbiol Immunol Infect*. 2015;48(5): 531–9. doi: 10.1016/j.jmii.2014.08.025.
10. Verma P, Berwal PK, Nagaraj N, Swami S, Jivaji P, Narayan S. Neonatal sepsis: Epidemiology, clinical spectrum, recent antimicrobial agents, and their antibiotic susceptibility pattern. *Int J Contemp Pediatr*. 2015;2(3):176–80. doi: 10.18203/2349-3291.ijcp20150523
11. Awad HA, Mohamed MH, Badran NF, Mohsen M, Abd-Elrhman AS. Multidrug-resistant organisms in neonatal sepsis in

- two tertiary neonatal ICUs, Egypt. J Egypt Public Health Assoc. 2016;91(1):31–8. doi: 10.1097/01.EPX.0000482038.76692.3.
12. Shrestha S, Shrestha NC, Dongol Singh S, Shrestha RP, Kayestha S, Shrestha M, et al. Bacterial isolates and its antibiotic susceptibility pattern in NICU. Kathmandu Univ Med J. 2013;11(41):66–70.
13. Haryani S, Apriyanti YF. Evaluasi terapi obat pada pasien sepsis neonatal di ruang perinatologi RSUP Fatmawati Januari–Februari tahun 2016. Fatmawati Hosp J. 2016;1:1–10.
14. Fernando L. Pola bakteri dan sensitivitas antibiotik di NICU Siloam Hospitals Lippo Village, 2013–2014. Cermin Dunia Kedokt. 2017;44(3):167–70.
15. Estiningsih D, Puspitasari I, Nuryastuti T. Identifikasi infeksi multidrug-resistant organisms (MDRO) pada pasien yang dirawat di bangsal neonatal intensive care unit (NICU) rumah sakit. J Manajemen Pelayanan Farmasi. 2016;6(3):243–8. doi: 10.22146/jmpf.351
16. Prithadewi AAA, Hasmono D, Sukrama DM, Artana WD. Bacterial and antibiotics sensitivity pattern in neonatal sepsis patients. Folia Medica Indones. 2015;51 (1):1–6.
17. Trissel LA. Handbook on injectable drugs, 17th dition. Bethesda: American Society of Health-System Pharmacists; 2011.
18. Takemoto CK, Hodding JH, Kraus, DM. Pediatric & neonatal dosage handbook, 20th edition. Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc; 2013.
19. Wattengel BA, Sellick JA, Skelly MK, Napierala R Jr, Schroock J, Mergenhagen KA. Outpatient antimicrobial stewardship: Targets for community-acquired pneumonia. Clin Ther. 2019;41(3):466–76. doi: 10.1016/j.clinthera.2019.01.007.
20. Kumar A, Zarychanski R, Light B, Parrillo J, Maki D, Simon D, et al. Early combination antibiotic therapy yields improved survival compared with monotherapy in septic shock: A propensity-matches analysis. Crit Care Med. 2010;38(9):1773–85. doi: 10.1097/CCM.0b013e3181eb3cc.
21. Krzyżaniak N, Pawłowska I, Bajorek B. Review of drug utilization patterns in NICUs worldwide. J Clin Pharm Ther. 2016;41(6):612–20. doi: 10.1111/jcpt.12440
22. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Formularium Nasional 2017 [Diakses: 14 April 2018]. Tersedia dari: <http://farmalkes.kemkes.go.id/2018/02/formularium-nasional-2017/#.Wx4j70xuKUk>.
23. Le NK, Hf W, Vu PD, Khu DT, Le HT, Hoang BT, et al. High prevalence of hospital acquired infections caused by gram-negative carbapenem resistant strains in Vietnamese pediatric ICUs: A multi-centre point prevalence survey. Medicine. 2016;95(27):e4099. doi: 10.1097/MD.0000000000004099.
24. Morrill HJ, Pogue JM, Kaye KS, LaPlante KL. Treatment options for carbapenem-resistant Enterobacteriaceae infections. Open Forum Infect Dis. 2015; 2(2):ofv050. doi: 10.1093/ofid/ofv050
25. Trecarichi EM, Tumbarello M. Therapeutic options for carbapenem-resistant Enterobacteriaceae infections. Virulence. 2017;8(4):470–84. doi: 10.1080/21505594.2017.1292196.
26. Yamamoto M, Pop-Vicas AE. Treatment for infections with carbapenem-resistant Enterobacteriaceae: What options do we still have?. Crit Care. 2014;18(3):229. doi: 10.1186/cc13949.
27. Drawz SM, Bonomo RA. Three decades of β-lactamase inhibitors. Clin Microbiol Rev. 2010;23(1):160–201. doi: 10.1128/CMR.00037-09.
28. Bush K. Bench-to-bedside review: The role of β-lactamases in antibiotic-resistant gram-negative infections. Crit Care. 2010; 14(3):224. doi: 10.1186/cc8892.

29. Somily AM, Alsubaie SS, BinSaeed AA, Torchyan AA, Alzamil FA, Al-Aska AI, et al. Extended-spectrum β -lactamase-producing *Klebsiella pneumoniae* in the neonatal intensive care unit: Does vancomycin play a role?. *Am J Infect Control.* 2014;42(3):277–82.
30. Predrag S. Analysis of risk factors and clinical manifestations associated with *Clostridium difficile* disease in Serbian hospitalized patients. *Braz J Microbiol.* 2016;47(4):902–10. doi: 10.1016/j.bjm.2016.07.011.
31. Guh AY, Adkins SH, Li Q, Bulens SN, Farley MM, Smith Z, et al. Risk factors for community-associated *Clostridium difficile* infection in adults: A case-control study. *Open Forum Infect Dis.* 2017;4(4):ofx171. doi: 10.1093/ofid/ofx171.
32. Chalmers JD, Akram AR, Singanayagam A, Wilcox MH, Hill AT. Risk factors for *Clostridium difficile* infection in hospitalized patients with community-acquired pneumonia. *J Infect.* 2016;73(1):45–53. doi: 10.1016/j.jinf.2016.04.008
33. Trisnowati KE, Irawati S, Setiawan E. Kajian penggunaan antibiotik pada pasien diare akut di bangsal rawat inap anak. *J Manajemen Pelayanan Farmasi.* 2017;17(1):16–24. doi: 10.22146/jmpf.363
34. Halim SV, Yulia R, Setiawan E. Penggunaan antibakteri golongan Carbapenem pada pasien dewasa rawat inap sebuah rumah sakit swasta di Surabaya. *Indones J Clin Pharm.* 2017;6(4):290–4. doi: 10.15416/i-jcp.2017.6.4.267
35. Hidayat F, Setiadi A, Setiawan E. Analisis penggunaan dan biaya antibiotik di ruang rawat intensif sebuah Rumah Sakit di Surabaya. *Pharmaciana.* 2017;7(2):213–30. doi: 10.12928/pharmaciana.v7i2.6767
36. Lew KY, Ng TM, Tan M, Tan SH, Lew EL, Ling LM, et al. Safety and clinical outcomes of carbapenem de-escalation as part of an antimicrobial stewardship programme in an ESBL-endemic setting. *J Antimicrob Chemother.* 2015; 70(4):1219–25. doi: 10.1093/jac/dku479.
37. Haque A, Hussain K, Ibrahim R, Abbas Q, Ahmed SA, Jurair H, et al. Impact of pharmacist-led antibiotic stewardship program in a PICU of low/middle-income country. *BMJ Open Qual.* 2018;7(1):e000180. doi: 10.1136/bmjoq-2017-000180
38. MacGowan A. Revisiting beta-lactams-PK/PD improves dosing of old antibiotics. *Curr Opin Pharmacol.* 2011;11(5):470–6. doi: 10.1016/j.coph.2011.07.006.
39. Nielsen EI, Cars O, Friberg LE. Pharmacokinetic/Pharmacodynamic (PK/PD) indices of antibiotics predicted by a semimechanistic PKPD model: A step toward model-based dose optimization. *Antimicrob Agents Chemother.* 2011;55(10):4619–30. doi: 10.1128/AAC.00182-11
40. Walker MC, Lam WM, Manasco KB. Continuous and extended infusions of β -lactam antibiotics in the pediatric population. *Ann Pharmacother.* 2012;46(11):537–46. doi: 10.1345/aph.1R216.
41. Neonatal Formulary. Drug use in pregnancy and first year of life, 5th edition. Singapore; Balckwell Publishing: 2007.
42. Abdel-Bari A, Mokhtar MS, Sabry NA, El-Shafi SA, Bazan NS. Once versus individualized multiple daily dosing of aminoglycoside in critically ill patients. *Saudi Pharm J.* 2011;19(1):9–17. doi: 10.1016/j.jsps.2010.11.001
43. Rao SC, Srinivasjois R, Moon K. One dose per day compared to multiple doses per day of gentamycin for treatment of suspected or proven sepsis neonates. *Cochrane Database Syst Rev.* 2016;(11):CD005091. doi: 10.1002/14651858.CD005091.pub4.
44. Darmstadt GL, Batra M, Zaidi AK. Parenteral antibiotics for the treatment

- of serious neonatal bacterila infection in developing country. *Pediatr Infect Dis J.* 2009;28(1):S37–42. doi: 10.1097/INF.0b013e31819588c3.
45. Huth ME, Ricci AJ, Cheng AG. Mechanisms of aminoglycoside ototoxicity and targets of hair cell protection. *Int J Otolaryngol.* 2011;2011: 937861. doi: 10.1155/2011/937861.
46. Wargo KA, Edwards JD. Aminoglycoside-induced nephrotoxicity. *J Pharm Pract.* 2014;27(6):573–7. doi: 10.1177/0897190014546836.
47. Furyk JS, Swan Q, Molyneux E. Systematic review: Neonatal meningitis in the developing world. *Trop Med Int Health.* 2011;16(6):672–9. doi: 10.1111/j.1365-3156.2011.02750.x.
48. Nosrati A, Ben Tov A, Reif S. Diagnostic markers of serious bacterial infections in febrile infants younger than 90 days old. *Pediatr Int.* 2014;56(1):47–52. doi: 10.1111/ped.12191.

Jurnal Farmasi Klinik Indonesia

Indonesian Journal of Clinical Pharmacy

Terakreditasi: DIKTI: SK Menteri Kesehatan No. 2102/MO/2014



PERIODE PUBLIKASI / JAHING



Terakreditasi DIKTI, SK Mendikbud RI Nomor 212/P/2014

HOME LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS CONTACT CITATIONS
ABOUT ABOUT

[Home](#) > [About the Journal](#) > [Editorial Team](#)

Editor in Chief

Keri Lestari, Faculty of Pharmacy Universitas Padjadjaran, Indonesia

Editorial Board

Henk-Jan Guchelaar, Department of Clinical Pharmacy and Toxicology, Leiden University Medical Center-LUMC, Leiden, Netherlands
 Maarten J. Postma, Department of Pharmacy, Faculty of Science and Engineering, University of Groningen, Groningen, Netherlands
 Hiroshi Koyama, Departement of Public Health, Graduate School of Medicine Faculty of Medicine, Gunma University Maebashi, Japan
 Syed Azhar Syed Sulaiman, School of Pharmaceutical Sciences, Universiti Sains Malaysia, Pinang Islands, Malaysia
 Debabrata Banerjee, Department of Pharmacology, The Cancer Institute of NJ, Rutgers, The State University of New Jersey, United States
 Iwan Dwiprahasto, Faculty of Medicine Universitas Gadjah Mada, Indonesia
 Dyah Aryani Perwitasari, Faculty of Pharmacy Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
 Elin Yulinah Sukandar, School of Pharmacy, Institut Teknologi Bandung, Indonesia
 Zullies Ikawati, Faculty of Pharmacy Universitas Gadjah Mada, Indonesia
 Uly Adhie Mulyani, Ministry of Health of Republic of Indonesia, Indonesia
 Ajeng Diantini, Faculty of Pharmacy Universitas Padjadjaran, Indonesia
 Tri Hanggono Achmad, Faculty of Medicine Universitas Padjadjaran, Indonesia
 Budi Setiabudhiawan, Faculty of Medicine Universitas Padjadjaran, Indonesia
 Ida Parwati, Faculty of Medicine Universitas Padjadjaran, Indonesia
 Dedy Almasdy, Faculty of Pharmacy Universitas Andalas, Indonesia
 Rizky Abdulah, Faculty of Pharmacy Universitas Padjadjaran, Indonesia

ONLINE SUBMISSIONS

FOCUS AND SCOPE

AUTHOR GUIDELINES

PUBLICATION ETHICS

EDITORIAL TEAM

PEER-REVIEWERS

SUBSCRIPTION/ORDER

INDEXING

ABOUT THE JOURNAL

USER

Username

Password

Remember me

Login

PAuS Login

RSS-FEED

Search :

Keywords...

Search Scope

All

Search

Browse

- ▶ By Issue
- ▶ By Author
- ▶ By Title
- ▶ Other Journals
- ▶ Categories

NOTIFICATIONS

- ▶ View
- ▶ Subscribe

LANGUAGE

English

Change

MANUSCRIPT TEMPLATE





Terakreditasi DIKTI, SK Mendikbud RI Nomor 212/P/2014

HOME LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS CONTACT CITATIONS
 ABOUT ABOUT

Home > Archives > Vol 8, No 1 (2019)

DOI: <https://doi.org/10.15416/ijcp.2019.8.1>

Table of Contents

Hubungan antara Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Gaya Hidup Sehat dengan Risiko Penyakit Kardiovaskular pada Orang Dewasa di Pedesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta

10.15416/ijcp.2019.8.1.1

Aris Widayati, Fenty Fenty, Yunita Linawati

PDF
(BAHASA
INDONESIA)
1-11

Efektivitas Biaya Terapi Cairan Kristaloid dan Koloid pada Pasien Anak Demam Berdarah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul

10.15416/ijcp.2019.8.1.12

Chotijatun Nasriyah, Baiq A. A. Munawwarah, Dyah A. Perwitasari

PDF
(BAHASA
INDONESIA)
12-18

Hubungan Pemberian Terapi Antipsikotik terhadap Kejadian Efek Samping Sindrom Ekstrapiramidal pada Pasien Rawat Jalan di Salah Satu Rumah Sakit di Bantul, Yogyakarta

10.15416/ijcp.2019.8.1.19

Haafizah Dania, Imaniar N. Faridah, Khansa F. Rahmah, Rizky Abdulah, Melisa I. Bariana, Dyah A. Perwitasari

PDF
(BAHASA
INDONESIA)
19-30

Efek Konseling Menggunakan Brief Counseling 5A Modifikasi Disertai Pesan Motivasional Farmasis dalam Peningkatan Perilaku dan Outcome Klinik Pasien Diabetes Melitus dengan Hipertensi Rawat Jalan di RSUD Panembahan Senopati, Bantul

10.15416/ijcp.2019.8.1.31

Ginanjar Z. Saputri, Akrom Akrom, Muhammad Muhlis, Ainun Muthoharoh

PDF
(BAHASA
INDONESIA)
31-41

Masalah Farmasetika dan Interaksi Obat pada Resep Racikan Pasien Pediatri: Studi Retrospektif pada Salah Satu Rumah Sakit di Kabupaten Bogor

10.15416/ijcp.2019.8.1.42

Anna U. H. Rochjana, Mahdi Jufri, Retnosari Andrajati, Ratu A. D. Sartika

PDF
(BAHASA
INDONESIA)
42-48

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Obat Tradisional pada Pasien Hiperkolesterolemia di Rumah Riset Jamu "Hortus Medicus"

10.15416/ijcp.2019.8.1.49

Tyas F. Dewi, Ulfatun Nisa

PDF
(BAHASA
INDONESIA)
49-57

Kajian Penggunaan Antibiotik pada Neonatus Intensive Care Unit di Sebuah Rumah Sakit Pemerintah di Surabaya

10.15416/ijcp.2019.8.1.58

Felix Hidayat, Adjie P. Setiadi, Eko Setiawan

PDF
58-71

Profil Penggunaan Antidiabetik pada Pasien Diabetes Melitus Gestasional di Puskesmas Wilayah Kecamatan Pontianak Kota

10.15416/ijcp.2019.8.1.72

Kharina Anisya, Robiyanto Robiyanto, Nurmainah Nurmainah


PDF
(BAHASA
INDONESIA)
72-80

Authors and Keywords Index

Editorial Board

PDF

Indonesian Journal of Clinical Pharmacy is indexed by



ONLINE SUBMISSIONS

FOCUS AND SCOPE

AUTHOR GUIDELINES

PUBLICATION ETHICS

EDITORIAL TEAM

PEER-REVIEWERS

SUBSCRIPTION/ORDER

INDEXING

ABOUT THE JOURNAL

USER

Username

Password

Remember me

Login

PAuS Login

RSS-FEED

Search :

Keywords...

Search Scope

All

Search

Browse

- ▶ By Issue
- ▶ By Author
- ▶ By Title
- ▶ Other Journals
- ▶ Categories

NOTIFICATIONS

▶ View

▶ Subscribe

LANGUAGE

English

Change

MANUSCRIPT TEMPLATE



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 212/P /2014

TENTANG

AKREDITASI TERBITAN BERKALA ILMIAH PERIODE I TAHUN 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu terbitan berkala ilmiah yang terbit di Indonesia, perlu dilakukan akreditasi terhadap terbitan berkala dimaksud;

b. bahwa pemberian status akreditasi terhadap suatu terbitan berkala ilmiah merupakan upaya pemerintah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa terbitan berkala ilmiah yang bersangkutan memenuhi persyaratan mutu sesuai hasil penilaian Tim Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

c. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan penilaian dan pemberian status akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan hasil akreditasi terbitan berkala ilmiah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Periode I Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 328);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 459);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG AKREDITASI TERBITAN BERKALA ILMIAH PERIODE I TAHUN 2014.

- KESATU : Menetapkan Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Periode I Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Akreditasi terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini, termasuk nomor terbitan yang diajukan dalam proses akreditasi.
- KETIGA : Setiap terbitan berkala ilmiah diwajibkan mencantumkan masa berlaku akreditasi dengan menuliskan tanggal penetapan dan tanggal akhir masa berlaku akreditasi.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari ditemukan data yang tidak sesuai dengan fakta, maka status akreditasi terbitan berkala ilmiah yang bersangkutan dinyatakan gugur.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
anb.
SEKRETARIS JENDERAL

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,


Ani Nurdiani Azizah ✓
NIP 195812011986032001

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 212/P/2014
TENTANG
AKREDITASI TERBITAN BERKALA ILMIAH PERIODE I
TAHUN 2014**

AKREDITASI TERBITAN BERKALA ILMIAH PERIODE I TAHUN 2014

Bidang Ilmu	Nomor	Judul	ISSN	Penerbit	Alamat	Pengakuan
Agama	1	TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam	2088-7957	Jurusan Akidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya	http://teosofi.uinsby.ac.id/index.php/teosofi	Terakreditasi B
	2	MADANIA (Jurnal Kajian Keislaman)	1410-8143	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu	www.iainbengkulu.ac.id	Terakreditasi B
	3	Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies (IJIMS)	2089-1490	Program Pascasarjana STAIN Salatiga	www.pps.stainsalatiga.ac.id	Terakreditasi A
	4	Jurnal Pemikiran Islam: Al-Tahrir	1412-7512	STAIN Ponorogo	stainponorogo.ac.id	Terakreditasi B
Ekonomi	1	The South East Asian Journal of Management	1978-1989	Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia	journal.ui.ac.id/tseajm	Terakreditasi B

Rencana Pengembangan dan Penerapan Jurnal Ilmiah di Lingkungan Universitas Brawijaya						
	No.	Jurnal Ilmiah	Nomor ISSN	Penerbit	Alamat	Klasifikasi
	2	Jurnal Akuntansi Multiparadigma	2086-7603	Jurusan Akutansi Fakultas Bisnis Universitas Brawijaya	www.jamal.ub.ac.id	Terakreditasi B
Kesehatan	1	Jurnal Farmasi Klinik Indonesia	2252-6218	Universitas Padjadjaran	www.ijcp.or.id	Terakreditasi B
	2	Jurnal Farmasi Indonesia	1412-1107	Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia	http://jfi.iregway.com	Terakreditasi B
	3	Jurnal Anestesiologi Indonesia	2089-970X	Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Insentif Indonesia (PERDATIN) Pusat	http://www.janesti.com	Terakreditasi B
	4	KEMAS	1858-1196	Jur. Kesehatan Masyarakat FIK UNNES Bekerjasama dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Pusat	http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas	Terakreditasi B
	5	Indonesian Journal of Obstetrics and Gynecology (INAJOG)	2338-6401	Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI)	www.indonesia.digitaljournals.org/index.php/IJOG	Terakreditasi B
Pertanian	1	Jurnal Ilmu dan Teknologi Kayu Tropis	1693-3834	Masyarakat Penelitian Kayu Indonesia (The Indonesian Wood Research Society)	http://www.mapeki.org/jitkt/	Terakreditasi B

	2	Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis	2087-9423	Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia dan Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, FPIK-IPB	http://itk.fpik.ipb.ac.id/	Terakreditasi B
Rekayasa	1	Kursor	0216-0544	Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Trunojoyo	http://kursor.trunojoyo.ac.id	Terakreditasi B

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
anb.
SEKRETARIS JENDERAL

TTD.

AINUN NAIM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001