

Identifikasi Alkohol dalam *Hand Sanitizer* secara *Fourier Transform Infra Red* (FTIR) dan Kemometrik

Kusuma Hendrajaya, Nur Jamaliah, dan Azminah

Fakultas Farmasi, Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia

Korespondensi: Azminah

Email: azminah@staff.ubaya.ac.id

Submitted: 16-08-2021, Revised: 16-11-2021, Accepted: 20-12-2021

ABSTRAK: *Hand sanitizer* merupakan produk yang mengandung zat antiseptik untuk mencuci tangan tanpa harus dibilas dengan air. Alkohol sebagai bahan aktif dalam *hand sanitizer* banyak digunakan sebagai antiseptik yang mempunyai aktivitas bakterisidal. Saat pandemi *covid-19* banyak *hand sanitizer* yang beredar di pasaran dengan kadar alkohol antara 60%-80%. Identifikasi adanya alkohol umumnya dengan metode kromatografi gas. Metode analisis untuk identifikasi alkohol dalam *hand sanitizer* dengan menggunakan spektrometer *Fourier Transform Infra Red* (FTIR) dan kemometrik dapat digunakan dengan penyiapan sampel yang lebih sederhana dan cepat. Spektrum FTIR menampilkan puncak-puncak dari gugus fungsi dan ikatan kimia dari senyawa-senyawa dalam sampel. Data spektrum FTIR dikombinasikan dengan metode kemometrik (PCA, analisis kluster, dan PLS), digunakan untuk identifikasi dan mengelompokkan sampel uji *hand sanitizer* dan standar *hand sanitizer*. Hasil menunjukkan metode spektrometri FTIR dan kemometrik dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan sampel uji *hand sanitizer* dan standar *hand sanitizer* dengan variasi kadar alkohol dalam *hand sanitizer* 60%, 65%, 70%, 75%, dan 80%.

Kata kunci: alkohol; *hand sanitizer*; kemometrik; spektrometer FTIR

ABSTRACT: *Hand sanitizer* is a product that contains antiseptic substances to wash hands without having to rinse with water. Alcohol as an active ingredient in *hand sanitizer* is widely used as an antiseptic which has bactericidal activity. During the COVID-19 pandemic, there are many *hand sanitizers* on the market containing alcohol between 60% and 80%. Identification of the presence of alcohol is generally conducted by gas chromatography method. The analytical method for identification of alcohol in *hand sanitizer* using *Fourier Transform Infra Red* (FTIR) spectrometer and chemometrics can be used with simpler and faster sample preparation. The FTIR spectrometer displays the peaks of the functional groups and chemical bonds of the compounds in the samples. FTIR spectra combined with chemometric methods (PCA, cluster analysis, and PLS) were used to identify and classify *hand sanitizer* test samples and standards. The results show that FTIR and chemometric methods can identify and classify *hand sanitizer* test samples and standards with variations in alcohol content (60%, 65%, 70%, 75% and 80%).

Keywords: alcohol; chemometrics; FTIR spectrometer; *hand sanitizer*

1. Pendahuluan

Hand sanitizer merupakan produk pemberisih tangan yang mengandung zat antiseptik yang digunakan untuk mencuci tangan tanpa harus membilasnya dengan air [1]. Penggunaan *hand sanitizer* sangat mudah diaplikasikan dengan meneteskan pada telapak tangan kemudian meratakan ke permukaan telapak tangan. *Hand sanitizer* berbahan aktif alkohol sangat baik untuk membersihkan tangan hanya ketika tangan dalam keadaan bersih untuk memastikan kuman benar-benar mati [2]. Menurut *World Health Organization* (WHO) dan *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) kandungan alkohol dalam *hand sanitizer* yang berfungsi sebagai antiseptik pada rentang 60-95% [2,3,4]. Meskipun dapat membunuh mikroorganisme dan virus, kadar alkohol diatas 80% juga tidak disarankan karena cepat menguap. Banyak penelitian yang telah dilakukan terkait efektifitas kandungan alkohol dalam *hand sanitizer*, dimana hasilnya menunjukkan bahwa kandungan alkohol 60-80% memberikan efikasi yang baik sebagai antiseptik [5,6]. Produk *hand sanitizer* yang beredar di Indonesia mempunyai kandungan alkohol pada rentang 60-80%.

Untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan alkohol dalam suatu produk umumnya digunakan metode analisis kromatografi gas [7,8,9,10]. Penyiapan sampel pada analisis dengan gas kromatografi tidak sederhana dan relatif mahal. Oleh karena itu, metode analisis alkohol dengan penyiapan sampel yang cepat dan sederhana perlu dikembangkan. Metode analisis dengan spektroskopi FTIR dan kemometrik saat ini banyak dikembangkan untuk identifikasi dan pengelompokan, serta analisis kuantitatif.

Spektroskopi FTIR menghasilkan spektrum yang merupakan hasil interaksi antara senyawa-senyawa kimia dalam sampel yang rumit. Spektrum FTIR kaya akan informasi struktur molekular dengan banyak puncak serapan yang spesifik untuk gugus fungsi dan ikatan kimia [11]. Spektroskopi FTIR memiliki kelebihan dalam penyiapan sampel yang cepat dan sederhana, serta langsung dapat dianalisis tanpa proses pemisahan

[12,13]. Namun demikian spektroskopi FTIR juga memiliki kekurangan, yaitu analit dalam sampel tidak dipisahkan sehingga dapat terjadi tumpang tindih spektrum serapan dari senyawa-senyawa dalam sampel tersebut. Oleh karena itu dapat dibantu dengan kemometrik untuk mengolah data spektrumnya [14,15,16].

Penelitian ini bertujuan mengembangkan metode analisis untuk mengidentifikasi alkohol dalam gel *hand sanitizer* dengan spektroskopi FTIR dan kemometrik. Metode kemometrik yang digunakan adalah *Principle Component Analysis* (PCA), *Cluster Analysis* (CA) untuk mengelompokkan, dan *Partial Least Square* (PLS) untuk melihat hubungan kuantitatif antara data multivariat dari spektrum FTIR dengan kadar alkohol dalam sampel.

2. Metode penelitian

2.1. Alat dan bahan

Alat-alat yang digunakan adalah spektrometer *Fourier Transform Infra Red* (FTIR, Agilent Cary 630), perangkat PC (*Personal Computer*), mikropipet (Socorex 0,5-5,0 ml), neraca analitik (OHAUS), mortir dan stamper, serta alat-alat gelas laboratorium. Bahan-bahan yang digunakan meliputi alkohol 96% (Merck), karbomer 940, metilparaben, gliserin, trietanolamin, dan aquadestilata.

2.2. Pembuatan *hand sanitizer*

Dibuat standar *hand sanitizer* yang mengandung alkohol 60, 65, 70, 75, 80%. Formula *hand sanitizer* dalam skala 25 ml terdiri dari bahan aktif alkohol (masing masing 60, 65, 70, 75, 80%), dengan karbomer 940 (0,5 g) sebagai basis gel, gliserin (0,5 ml) sebagai emolien, metilparaben (0,5 g) sebagai pengawet, dan trietanolamin (0,6 ml) sebagai *alkalizing agent*, serta aquadestilata [17].

2.3. Analisis data

Standar alkohol 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, dan 5 sampel uji (EL, DT, ES, SN, IT) masing-


masing dibaca data absorbansi dengan spektrometer FTIR pada bilangan gelombang 4000-400 cm^{-1} . Data selanjutnya diolah secara kemometrik dengan *Principle Component Analysis* (PCA), *Cluster Analysis* (CA), dan *Partial Least Square* (PLS). Analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Minitab®18.1.

3. Hasil dan pembahasan


Spektrum FTIR dari standar alkohol, standar *hand sanitizer*, dan sampel uji EL, DT, ES, SN, dan IT memiliki pola yang mirip dan tidak menunjukkan adanya perbedaan yang khas (Gambar 1). Struktur alkohol terdiri dari gugus metil, metilen, dan hidroksi (Gambar 2). Perbedaan terletak

pada intensitas serapannya. Puncak-puncak yang teramati pada spektrum tersebut adalah pada bilangan gelombang 800-750 cm^{-1} terdapat vibrasi tekuk C-H, pada 1085-1050 cm^{-1} terdapat vibrasi ulur C-O, bilangan gelombang 2000-1600 cm^{-1} menunjukkan adanya vibrasi tekuk C-H, pada 3000-2840 cm^{-1} adanya vibrasi ulur C-H dari metil, dan pada 3400-3200 cm^{-1} ada vibrasi ulur O-H [18]. Hal ini menunjukkan adanya gugus hidroksi dari alkohol atau metil paraben dan trietanolamin, dan ikatan C-H (metil) dari alkohol atau metil paraben.

Untuk dapat membedakan dan mengelompokkan data spektrum FTIR tersebut, maka data diolah dengan kemometrik. Data spektrum dari standar alkohol, standar *hand sanitizer*, dan sampel uji diolah dengan metode *Principle Com-*



Gambar 1. Spektra ATR-FTIR. 1-5 berturut-turut menyatakan standar alkohol 60%, 65%, 70%, 75%, dan 80%; 6-10 berturut-turut menunjukkan *hand sanitizer* alkohol 60%, 65%, 70%, 75%, dan 80%; 11-15 berturut-turut menyatakan sampel *hansanitizer* merk EL, DT, SS, SN, dan IT



Gambar 2. Struktur 3 dimensi (3D) etanol yang terdiri dari gugus metil, metilen, hidroksi


ponent Analysis (PCA) dan *Cluster Analisis* (CA). PCA adalah suatu Teknik dalam kemometrik untuk pengelompokkan. Teknik ini mereduksi data multivarian, ketika antar variabel terjadi korelasi. Ketika suatu sampel mempunyai *Principle Component* (PC) yang hampir sama, maka akan mempunyai sifat kimia fisika yg hampir sama juga sehingga dapat dikelompokkan. Untuk kalibrasi multivarian dari data spektrum FTIR digunakan *Partial Least Square* (PLS) yang bertujuan untuk melihat hubungan linear dari banyak variabel dalam spektrum FTIR terhadap konsentrasi analit [19,20].

Data spektrum yang diolah dengan PCA menggunakan program Minitab berasal dari 14 bilangan gelombang, yaitu 3337 cm^{-1} , 2972 cm^{-1} , 2933 cm^{-1} , 2877 cm^{-1} , 1638 cm^{-1} , 1576 cm^{-1} , 1448 cm^{-1} , 1412 cm^{-1} , 1377 cm^{-1} , 1325 cm^{-1} , 1267 cm^{-1} , 1082 cm^{-1} , 1043 cm^{-1} , dan 875 cm^{-1} yang merupakan puncak-puncak utama dari spektrum FTIR. Hasil pengelompokan dengan metode PCA dapat dilihat pada Gambar 3. Gambar tersebut menunjukkan hubungan 14 komponen utama (PC) dengan *eigenvalue*. PC1 mempunyai varians 8,5567 atau 61,1% dari varians total, PC2 mempunyai varians 5,1226 atau 97,7% dari varians total. PC3 mempunyai varians 0,2628 atau 99,6% dari varians total. PC4 dan PC5 mempunyai varians 99,9% dari varians total. PC6 sampai PC14 mempunyai


variens 100% dari varians total. Hasil ini menunjukkan metode PCA dapat mengurangi data variabel yang awal ada 14 variabel (bilangan gelombang) dapat dijelaskan menjadi 5 variabel baru (sampai PC5), karena sampai PC5 sudah mampu mengekstrak informasi sebesar 99,9%.

Hubungan nilai PC1 dan PC2 dapat dilihat dari Gambar 4. Gambar tersebut menunjukkan *score plot* komponen utama (PC1 dan PC2) yang terdiri dari standar alkohol 60% (1), standar alkohol 65% (2), standar alkohol 70% (3), standar alkohol 75% (4), standar alkohol 80% (5), *hand sanitizer* alkohol 60% (6), *hand sanitizer* alkohol 65% (7), *hand sanitizer* alkohol 70% (8), *hand sanitizer* alkohol 75% (9), *hand sanitizer* alkohol 80% (10), sampel *hand sanitizer* merk EL (11), sampel *hand sanitizer* merk DT (12), sampel *hand sanitizer* merk SS (13), sampel *hand sanitizer* merk SN (14), serta sampel *hand sanitizer* merk IT (15).


Hasil analisis hubungan *score plot* PC1 dan PC2 sampel 1 (standar alkohol 60%), 2 (standar alkohol 65%), 6 (*hand sanitizer* alkohol 60%), 7 (*hand sanitizer* alkohol 65%), dan 8 (*hand sanitizer* alkohol 70%) menunjukkan jarak yang berdekatan. *Score plot* dari PC1 dan PC2 sampel 3 (standar alkohol 70%), 9 (*hand sanitizer* alkohol 75%), dan 10 (*hand sanitizer* alkohol 80%) menunjukkan jarak yang berdekatan. *Score plot* dari PC1 dan PC2 sampel 4 (standar alkohol 75%)



Gambar 3. Hubungan antara PC (1-14 komponen utama) dan *eigenvalue*



Gambar 4. Korelasi skor plot dari PC1 dan PC2 dari standar/sampel 1-15. 1-5 berturut-turut menyatakan standar alkohol 60%, 65%, 70%, 75%, dan 80%; 6-10 berturut-turut menunjukkan *hand sanitizer* alkohol 60%, 65%, 70%, 75%, dan 80%; 11-15 berturut-turut menyatakan sampel *hansanitizer* merk EL, DT, SS, SN, dan IT




Gambar 5. Kovarians skor plot dari PC1 dan PC2 dari standar 1-15. 1-5 berturut-turut menyatakan standar alkohol 60%, 65%, 70%, 75%, dan 80%; 6-10 berturut-turut menunjukkan *hand sanitizer* alkohol 60%, 65%, 70%, 75%, dan 80%; 11-15 berturut-turut menyatakan sampel *hansanitizer* merk EL, DT, SS, SN, dan IT

menunjukkan kedekatan dengan 11 (sampel merk EL) dan 13 (sampel merk SS). Hasil analisis menggunakan metode pengelompokkan dengan PCA mampu mengelompokkan serangkaian data dengan menunjukkan jarak kedekatan *score plot* PC1 dan PC2 dari sampel.

Gambar 5 menunjukkan visualisasi 2D (2 dimensi) PCA dalam bentuk kwadran (matriks korelasi) PC1 dan PC2 dari 14 bilangan gelombang.

Kuadran 1 terdiri dari: standar alkohol 60% (1), standar alkohol 65% (2), standar alkohol 70% (3), dan standar *hand sanitizer* alkohol 60% (6). Pada kuadran 2 terdiri dari: standar *hand sanitizer* alkohol 65% (7), standar *hand sanitizer* alkohol 70% (8), standar *hand sanitizer* alkohol 75% (9), dan standar *hand sanitizer* alkohol 80% (10). Pada kuadran 3 terdiri dari standar alkohol 75% (4), standar alkohol 80% (5), sampel uji *hand sa-*



Gambar 6. Dendrogram Analisis kluster dari pengelompokan standar alkohol dan sampel uji. 1-5 berturut-turut menyatakan standar alkohol 60%, 65%, 70%, 75%, dan 80%; 6-10 berturut-turut menunjukkan *hand sanitizer* alkohol 60%, 65%, 70%, 75%, dan 80%; 11-15 berturut-turut menyatakan sampel *hansanitizer* merk EL, DT, SS, SN, dan IT

nitizer EL (11), sampel uji *hand sanitizer* SS (13), sampel uji *hand sanitizer* SN (14), dan sampel uji *hand sanitizer* IT (15). Kwadran 4 terdiri dari sampel uji *hand sanitizer* merk EL, SS, SN, dan IT mengandung alkohol 75%-80% karena terletak pada satu kwadran. Pada kuadran 4 hanya ada satu sampel yaitu *hand sanitizer* merk DT (12).

Pengelompokan bentuk lain yaitu analisis kluster dengan pengolahan data spektrum menggunakan bantuan program Minitab pada 14 bilangan gelombang. Dari analisis kluster diperoleh dendrogram seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6. Tabel 1 menunjukkan bahwa tahap-tahap penghubung dengan skala vertikal memberikan jarak dan kemiripan antara 2 kelompok pada suatu titik ketika kedua kelompok ini digabungkan yaitu nomor 9 (*hand sanitizer* 75%) dan nomor 10 (*hand sanitizer* alkohol 80%) dengan jarak 0,0098 dan kemiripan 94,48% sehingga digabungkan dan diberi nama kelompok/kluster baru 1, nomor 4 (standar alkohol 75%) dan nomor 13 (sampel merk SS) dengan jarak 0,010 dan kemiripan 93,89% sehingga digabungkan dan diberi nama kelompok/kluster baru 2, nomor 7

(*hand sanitizer* alkohol 65%) dan nomor 8 (*hand sanitizer* alkohol 70%) dengan jarak 0,0125 dan kemiripan 92,95% sehingga digabungkan dan diberi nama kelompok/kluster baru 1, nomor 4 (standar alkohol 75%) dan nomor 11 (sampel merk EL) dengan jarak 0,015 dan kemiripan 91,317% sehingga digabungkan dan diberi nama kelompok/kluster baru 2, nomor 4 (standar alkohol 75%) dan nomor 5 (standar alkohol 80%) dengan jarak 0,0169 dan kemiripan 90,47% sehingga digabungkan dan diberi nama kelompok/kluster baru 2, nomor 1 (standar alkohol 60%) dan nomor 7 (*hand sanitizer* alkohol 65%) dengan jarak 0,0184 dan kemiripan 89,63% sehingga digabungkan dan diberi nama kelompok/kluster baru 1, nomor 14 (merk SN) dan nomor 15 (merk IT dengan jarak 0,0184 dan kemiripan 89,63% sehingga digabungkan dan diberi nama kelompok/kluster baru 2, nomor 3 (standar alkohol 70%) dan nomor 9 (*hand sanitizer* 75%) dengan jarak 0,019 dan kemiripan 88,989% sehingga digabungkan dan diberi nama kelompok/kluster baru 1, nomor 4 (standar alkohol 75%) dan nomor 14 (merk SN) dengan jarak 0,02 dan kemiripan 88,31% sehingga digabungkan dan diberi nama kelompok/kluster baru 2, nomor

Tabel 1. Hasil penggabungan dalam *Cluster Analysis* dengan perangkat lunak Minitab® 18.1

Step	Number of clusters	Similarity level	Distance level	Clusters joined		New cluster
1	14	94.4818	0.009818	9	10	1
2	13	93.8959	0.010861	4	13	1
3	12	92.9540	0.012536	7	8	1
4	11	91.3170	0.015449	4	11	2
5	10	90.4727	0.016951	4	5	2
6	9	89.6364	0.018439	1	7	1
7	8	89.6343	0.018443	14	15	1
8	7	88.9891	0.019591	3	9	1
9	6	88.3152	0.020790	4	14	1
10	5	87.1932	0.022786	1	2	1
11	4	83.4379	0.029468	1	6	3
12	3	82.8120	0.030581	1	3	2
13	2	82.2875	0.031514	1	4	2
14	1	26.7738	0.130285	1	12	2

Tabel 2. Hasil korelasi kadar alkohol dengan metode PLS

Bilangan gelombang (cm ⁻¹)	R ²	Error	PRESS	R ² (pred)	RMSEC	RMSEP
4000-1000 (14 puncak)	0,99783	0,0000544	0,0001971	0,992118	0,00329	0,006278
2935-3013	0,99802	0,0000494	0,0001361	0,994557	0,00314	0,005574
3017-3060	0,997	0,0000749	0,0002059	0,991762	0,00387	0,006418

1 (standar alkohol 60%) dan nomor 2 (standar alkohol 65%) dengan jarak 0,0227 dan kemiripan 87,19% sehingga digabungkan dan diberi nama kelompok/kluster baru 1, nomor 1 (standar alkohol 60%) dan nomor 6 (*hand sanitizer* 60%) dengan jarak 0,029 dan kemiripan 83,437% sehingga digabungkan dan diberi nama kelompok/kluster baru 1, nomor 1 (standar alkohol 60%) dan nomor 3 (standar alkohol 70%) dengan jarak 0,03 dan kemiripan 82,81% sehingga digabungkan dan diberi nama kelompok/kluster baru 1, nomor 1 (standar alkohol 60%) dan nomor 4 (standar alkohol 75%) dengan jarak 0,031 dan kemiripan 82,28% sehingga digabungkan dan diberi nama kelompok/kluster baru 1, nomor 1 (standar alkohol 60%) dan nomor 12 (merk DT)

dengan jarak 0,13 dan kemiripan 26,77% sehingga digabungkan dan diberi nama kelompok/kluster baru 3. Dapat dilihat dari dendrogram tersebut standar alkohol 60%, 65%, dan 70% berada satu kelompok/kluster dengan *hand sanitizer* 60%, 65%, 70%, 75%, dan 80%. Standar alkohol 75% dan 80% berada satu kelompok dengan sampel merk EL, SS, SN, dan IT. Sampel merk DT berbeda kluster dengan yang lainnya.

Untuk mendapatkan hubungan linier dari variabel multivariat dengan kadar alkohol dari standar alkohol (60%, 65%, 70%, 75%, 80%) menggunakan analisis kemometrik metode PLS (Tabel 2). Banyaknya standar minimal $2n+n$, dimana n adalah komponen yang akan dianalisis. Pada penelitian ini dianalisis satu komponen

alkohol, maka banyaknya standar yang diukur minimal $((2 \times 1) + 2) = 4$. Tahap selanjutnya data FTIR dilakukan analisis kemometrik metode PLS terhadap 3 rentang bilangan gelombang yaitu $4000 \text{ cm}^{-1} - 800 \text{ cm}^{-1}$ (dipilih 14 bilangan gelombang); $2935 \text{ cm}^{-1} - 3013 \text{ cm}^{-1}$; $3017 \text{ cm}^{-1} - 3060 \text{ cm}^{-1}$ (Tabel 3). Hasilnya pada rentang bilangan gelombang $2935 \text{ cm}^{-1} - 3013 \text{ cm}^{-1}$ didapatkan nilai R^2 dan akurasi alkohol dari *hand sanitizer* dengan nilai $R^2 = 0,998$ dan akurasi $98,75 - 99,02\%$; RMSEC (*Root Mean Squared Error of calibration*) 0,00314 dan RMSEP (*Root Mean Square Error of Prediction*) 0,005574; PRESS (*predicted residual error sum of squares*) 0,0001361. Nilai mendekati nol sehingga pada rentang bilangan ini dapat dipakai untuk penentuan kadar alkohol dalam gel *hand sanitizer*.

4. Kesimpulan

Gabungan teknik spektroskopi FTIR dengan PCA dan CA yang telah dikembangkan untuk identifikasi dan pengelompokan kandungan alkohol dalam gel *hand sanitizer* mampu membedakan dan mengelompokkan kandungan alkohol dalam gel *hand sanitizer*. Analisis dengan PLS menunjukkan hubungan linier terbaik dengan nilai R^2 0,998 pada rentang bilangan bilangan gelombang $2935 \text{ cm}^{-1} - 3013 \text{ cm}^{-1}$ dan akurasi $98,75 - 99,02\%$ untuk kadar alkohol dalam *hand sanitizer*. Metode yang telah dikembangkan cukup efisien dan dapat diterapkan pada sampel gel *hand sanitizer*.

Daftar pustaka

1. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 2008.
2. World Health Organization. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. First Global Patient Safety Challenge Clean Care is Safer Care. World Alliance for Patient Safety. World Health Organization Press; 2009.
3. CDC. Antimicrobial Spectrum and Characteristics of Hand-Hygiene Antiseptic Agents [Internet]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep; 2002; 51(RR16):45.
4. CDC. Show Me the Science – When & How to Use Hand Sanitizer in Community Settings. Centers for Disease Control and Prevention; 2020: 1–1.
5. Kampf G. Efficacy of ethanol against viruses in hand disinfection. *Journal of Hospital Infection*. 2018;98(4):331-8.
6. Mursyidi A. 2002. Alkohol dalam obat dan kosmetika. *Tarjih*, i, 26–36.
7. Muchtaridi M, Musfiroh I, Hambali MM, Indrayati W. Determination of Alcohol Contents of Fermented Black Tape Ketan Based on Different Fermentation Time Using Specificgravity, Refractive Index and Gc-Ms Methods. *Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences*. 2012;2(3):933-46.
8. Dubowski KM. Alcohol Determination in the Clinical Laboratory. *American Journal of Clinical Pathology*. 1980; 74(5):747-50.
9. Hermanto D, Andayani IGAS, Honiar R, Syofiyana LM, Ismillayli N. Penentuan Kandungan Etanol dalam Makanan dan Minuman Fermentasi Tradisional Menggunakan Metode Kromatografi Gas. *Chempublish Journal*. 2020;5(2):105-15.
10. Albab FQ, Nukhasanah. Penetapan kadar alkohol pada kosmetik menggunakan metode kromatografi gas. *Journal of Halal Science and Research*. 2020;1(1):30-8.
11. Sun S, Chen J, Zhou Q, Lu G, Chan K. 2010. Application of Mid-Infrared Spectroscopy in The Quality Control of Traditional Chinese Medicines. *Planta Med*. 2010;76:1987-96.
12. Bunaciu AA, Aboul-Enein HY, Fleschin S. 2011. Recent Applications of Fourier Transform Infrared Spectrophotometry in Herbal Medicines Analysis. *Appl. Spectrosc. Rev*. 2011;46:251-60.
13. Nandiyanto ABD, Oktiani R, Ragadhita R. How to read and interpret FTIR spectroscopy of organic material. *Indonesian Journal of Science and Tech-*

- nology*. 2019;4(1):97–118.
14. Gad HA, El-Ahmady SH, Abou-Shoer MI, Al-Azizi MM. Application of Chemometrics in Authentication of Herbal Medicines: A Review. *Phytochem. Anal.* 2012; 24: 1-24.
 15. Miller JN, Miller JC. Statistics and Chemometric for Analytical Chemistry. UK: Pearson Education, Essex; 2005. Adam MJ. Chemometrics in Analytical Spectroscopy 2nd Edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry; 2005.
 16. Widyawati L, Mustariani BAA, Purmafitriah E. Formulasi Sediaan Gel Hand Sanitizer Ekstrak Etanol Daun Sirsak (*Annona muricata* Linn.) sebagai Antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus*. *Jurnal Farmasetis*. 2017;6(2):47-57.
 17. Pavia DL, Lampman M, Kriz GZ. Introduction to Spectroscopy (6th ed). Belmont: Brooks/Cole Cengage Learning; 2015.
 18. Rohman A, Statistika dan Kemometrika Dasar Dalam Analisis Farmasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2019.
 19. Rohman A, Spektroskopi Inframerah dan Kemometrika untuk Analisis Farmasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2014.

p-ISSN 2527 - 6298
e-ISSN 2527 - 9017

mpi Media Pharmaceutica Indonesiana

VOLUME
NOMOR 4
DECEMBER 2021

3

MPI (Media Pharmaceutica Indonesiana)

[Current](#)

[Archives](#)

[Announcements](#)

[About](#)

Search

[Home](#) / [Editorial Team](#)

Editorial Team

Editor in Chief

Aditya Trias Pradana (Universitas Surabaya, Indonesia)

Gscholar

Scopus

Section Editor

Eko Setiawan (Universitas Surabaya, Indonesia)

Gscholar

Scopus

Tegar Achsendo Yuniarta (Universitas Surabaya, Indonesia)

Gscholar

Scopus

Karina Citra Rani (Universitas Surabaya, Indonesia)

Gscholar

Scopus

Nina Dewi Oktaviyanti (Universitas Surabaya, Indonesia)

Gscholar

Scopus

Associate Editor

Herman J. Woerdenbag (University of Groningen, Netherlands)

Scopus

Assoc. Prof. Dr. Omboon Vallisuta (Mahidol University, Thailand)

Scopus

Menino Osbert Cotta (The University of Queensland, Australia)

Scopus

Christina Avanti (Universitas Surabaya, Indonesia)

Gscholar

Scopus

Prof. Dwi Setyawan (Universitas Airlangga, Indonesia)

Gscholar

Scopus

Rika Yulia (Universitas Surabaya, Indonesia)

Gscholar

Scopus

Oeke Yunita (Universitas Surabaya, Indonesia)

Gscholar

Scopus

Retno Widyowati (Universitas Airlangga, Indonesia)

Gscholar

Scopus

Desak Ketut Ernawati (Universitas Udayana, Indonesia)

Gscholar

Scopus

Prof. Susi Ari Kristina (Universitas Gadjah Mada, Indonesia)

Gscholar

Scopus

Dini Kesuma (Universitas Surabaya, Indonesia)

Gscholar

Scopus

Hendri Wasito (Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia)

Gscholar

Scopus

Prof. I Ketut Adnyana (Institut Teknologi Bandung, Indonesia)

Gscholar

Scopus

Administrator

Siti Kusnul Khotimah

Maya Harfia A., A.Md.

MPI (Media Pharmaceutica Indonesiana)

[Current](#)

[Archives](#)

[Announcements](#)

[About](#)

[Home](#) / [Archives](#) / Vol. 3 No. 4 (2021): DECEMBER

Vol. 3 No. 4 (2021): DECEMBER



DOI: <https://doi.org/10.24123/mpi.v3i4>

Published: 2021-12-23

Original Research Articles

A Validated HPTLC Densitometric Method for The Quantitative Determination of Ubidecarenone in Bulk and in Capsule Formulation

Anandakumar Karunakaran, Anjana Elampulakkadu, Ramesh Jayaprakash, Senthilkumar Raju, Meka Dharshini Lakshmiganesh

197-207

Abstract Views: **175** PDF Downloads: **193** DOI <https://doi.org/10.24123/mpi.v3i4.4734>

PDF

Identifikasi Alkohol dalam Hand Sanitizer secara Fourier Transform Infra Red (FTIR) dan Kemometrik

Kusuma Hendrajaya, Nur Jamailah, Azminah Azminah

208-216

Abstract Views: **1889** PDF Downloads: **1362** DOI <https://doi.org/10.24123/mpi.v3i4.4627>

PDF

Identification of Potential Ebola Virus Nucleoprotein (EBOV NP) Inhibitor Derivate from Various Traditional Medicinal Plants in Indonesia: in silico study

Yulanda Antonius, Jeremi Ongko, Johan Sukweenadhi, Sulistyo Emantoko Dwi Putra

217-226



 Abstract Views: **171**  PDF Downloads: **118**  DOI <https://doi.org/10.24123/mpi.v3i4.4716>

 PDF

Bioaktivitas Ekstrak Kulit Buah Nanas (*Ananas comosus* (L.) Merr.) dalam Sabun Cuci Piring sebagai Antibakteri terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*

Urmatul Waznah, Khusna Santika Rahmasari, Wulan Agustin Ningrum, Slamet

227-234

 Abstract Views: **1016**  PDF Downloads: **1747**  DOI <https://doi.org/10.24123/mpi.v3i4.4721>

 PDF

Formulasi Granul Minuman Fungsional Kombinasi Ekstrak Etanol Daun Jambu Biji (*Psidium guajava*) dan Ekstrak Etanol Biji Klabet (*Trigonella foenum-graecum*)

Arya Eka Wardhana , Karina Citra Rani, Aditya Trias Pradana, Nikmatul Ikhrom Eka Jayani

235-244

 Abstract Views: **361**  PDF Downloads: **529**  DOI <https://doi.org/10.24123/mpi.v3i4.4771>

 PDF

Analisis Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Pneumonia Komunitas di RSUD Kabupaten Kediri

Vita Kresnawati, Fauna Herawati, Hermawan Crisdiono, Rika Yulia

245-252

 Abstract Views: **472**  PDF Downloads: **1003**  DOI <https://doi.org/10.24123/mpi.v3i4.4468>


 PDF

Critical Review

Review: Pemanfaatan Teknik Kemometrika Pengenalan Pola Pada Analisis Kuantitatif Senyawa Obat Kombinasi Tanpa Tahap Pemisahan

Paulina Nadya Feranti Pebby Lorenza, Angelina Kinsha Pandhita, Desy Natalia Rambu Padji Mahemba, Arya Pratama Nugraha Pedo, Theodora Dominika Gadi Seran, Dewi Setyaningsih, Florentinus Dika Octa Riswanto

253-267

 Abstract Views: **1044**  PDF Downloads: **1551**  DOI <https://doi.org/10.24123/mpi.v3i4.4719>

 PDF

Additional Menu:

SUBMISSION TUTORIAL

LOGIN TROUBLESHOOT TUTORIAL

E-BROCHURE

AUTHOR GUIDELINES

[ONLINE SUBMISSION](#)

[STATEMENT OF ORIGINALITY](#)

[COPYRIGHT TRANSFER FORM](#)

[PUBLICATION ETHICS](#)

[SCREENING OF PLAGIARISM](#)

[EDITORIAL BOARD](#)

[PEER REVIEW](#)

[VISITOR STATISTICS](#)

[INDEXING & ABSTRACTING](#)

Most read last week

[Anatomi Jaringan, Identifikasi Mikroskopis, serta Kadar Polifenol Ekstrak Etanol Daun dari Tiga Jenis Jambu Genus Syzygium](#)

 112

[Formulasi Sediaan Sabun Cuci Tangan Ekstrak Jeruk Nipis \(Citrus aurantifolia\) dan Efektivitasnya sebagai Antiseptik](#)

 91

[Metode Monocyte Activation Test \(MAT\) dan Recombinant Factor C \(rFC\) sebagai Alternatif Metode Pengujian Pirogen bagi Perusahaan Farmasi di Indonesia](#)

 88

[Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Kayu Secang \(Caesalpinia sappan\) Menggunakan Metode DPPH, ABTS, dan FRAP](#)

 70

[Identifikasi Alkohol dalam Hand Sanitizer secara Fourier Transform Infra Red \(FTIR\) dan Kemometrik](#)

 65

Achievement :

SERTIFIKAT

Kementerian Riset dan Teknologi/
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Petikan dari Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
Nomor 85/M/KPT/2020
Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 1 Tahun 2020
Nama Jurnal Ilmiah
MPI (Media Pharmaceutica Indonesiana)
E-ISSN: 25279017
Penerbit: Fakultas Farmasi Universitas Surabaya
Ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah

TERAKREDITASI PERINGKAT 4

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu
Volume 2 Nomor 4 Tahun 2019 sampai Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024

Jakarta, 01 April 2020

Menteri Riset dan Teknologi/
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
Republik Indonesia,



Bambang P. S. Brodjonegoro



Journal Template :



Journal
Template

Tools :



MENDELEY

EndNote



Counter :



[View My Stats](#)

Information

- [For Readers](#)
- [For Authors](#)
- [For Librarians](#)

Keywords



MPI (MEDIA PHARMACEUTICA INDONESIA)

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SURABAYA

P-ISSN : 25276208 <> E-ISSN : 25279017 Subject Area : Health, Science



1

Impact Factor



442

Google Citations



Sinta 4

Current Accreditation

Google Scholar Garuda Website Editor URL

History Accreditation

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Garuda Google Scholar

The Efficacy of Watermelon (Citrullus lanatus) Rind Extract in Healing Burns in Balb/C Male Mice
Fakultas Farmasi, Universitas Surabaya MPI (Media Pharmaceutica Indonesiana) Vol. 5 No. 1 (2023): JUNE 28-35
2023 DOI: 10.24123/mpi.v5i1.5241 Accred : Sinta 4

Mekanisme Penghambat Sodium-Glukosa Transport Protein-2 (SGLT2-i) pada Penyakit Kardiovaskular: Sebuah Tinjauan
Fakultas Farmasi, Universitas Surabaya MPI (Media Pharmaceutica Indonesiana) Vol. 5 No. 1 (2023): JUNE 71-85
2023 DOI: 10.24123/mpi.v5i1.5266 Accred : Sinta 4

Pola Penggunaan Obat pada Disabilitas Tunanetra: Kajian Naratif
Fakultas Farmasi, Universitas Surabaya MPI (Media Pharmaceutica Indonesiana) Vol. 5 No. 1 (2023): JUNE 86-93
2023 DOI: 10.24123/mpi.v5i1.5299 Accred : Sinta 4

Anatomi Jaringan, Identifikasi Mikroskopis, serta Kadar Polifenol Ekstrak Etanol Daun dari Tiga Jenis Jambu Genus Syzygium
Fakultas Farmasi, Universitas Surabaya MPI (Media Pharmaceutica Indonesiana) Vol. 5 No. 1 (2023): JUNE 36-48
2023 DOI: 10.24123/mpi.v5i1.5311 Accred : Sinta 4

Kajian Continuity of Care Pasien Program Rujuk Balik di Puskesmas Kota Surabaya

Fakultas Farmasi, Universitas Surabaya  [MPI \(Media Pharmaceutica Indonesiana\) Vol. 5 No. 1 \(2023\): JUNE 9-19](#)
 2023  [DOI: 10.24123/mpi.v5i1.5484](#)  [Accred : Sinta 4](#)

Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Ketidaksesuaian Pemberian Statin pada First-user Statins di Apotek UBAYA

Fakultas Farmasi, Universitas Surabaya  [MPI \(Media Pharmaceutica Indonesiana\) Vol. 5 No. 1 \(2023\): JUNE 1-8](#)
 2023  [DOI: 10.24123/mpi.v5i1.5494](#)  [Accred : Sinta 4](#)

Pengaruh Variasi Konsentrasi Dinatrium EDTA Terhadap Stabilitas Fisika dan pH Sediaan Salep Ekstrak Etanol Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L.)

Fakultas Farmasi, Universitas Surabaya  [MPI \(Media Pharmaceutica Indonesiana\) Vol. 5 No. 1 \(2023\): JUNE 49-59](#)
 2023  [DOI: 10.24123/mpi.v5i1.5539](#)  [Accred : Sinta 4](#)

Aktivitas Antiansietas Ekstrak Etanol Kulit Buah Pisang Cavendish (*Musa acuminata* Cavendish): Studi In Vivo dengan Metode Elevated Plus Maze (EPM), Light Dark Test (LDT), and Open Field Test (OFT)

Fakultas Farmasi, Universitas Surabaya  [MPI \(Media Pharmaceutica Indonesiana\) Vol. 5 No. 1 \(2023\): JUNE 60-70](#)
 2023  [DOI: 10.24123/mpi.v5i1.5576](#)  [Accred : Sinta 4](#)

Kajian Pustaka: Sediaan Kosmesetika Penumbuh Rambut dari Berbagai Herbal Nusantara

Fakultas Farmasi, Universitas Surabaya  [MPI \(Media Pharmaceutica Indonesiana\) Vol. 5 No. 1 \(2023\): JUNE 94-106](#)
 2023  [DOI: 10.24123/mpi.v5i1.5594](#)  [Accred : Sinta 4](#)

The Impact of Pharmaceutical Care Implementation on The Incidence of Drug-Related Problem and Clinical Outcome of Hypertension Patients at Puskesmas Lubuk Pakam in 2021

Fakultas Farmasi, Universitas Surabaya  [MPI \(Media Pharmaceutica Indonesiana\) Vol. 5 No. 1 \(2023\): JUNE 20-27](#)
 2023  [DOI: 10.24123/mpi.v5i1.5609](#)  [Accred : Sinta 4](#)

[View more ...](#)